



## דף הסבר

## קליטת יוד רדיואקטיבי (UPTAKE)

### המכון לרפואה גרעינית

ליד חדרי לידה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400485

08-6400940

פקס. 08-6400765

### מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד בלוטת התריס.

### הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש להגיע בצום החל מ-4 שעות לפני הבדיקה.
- אם הנך נוטלת אחת מהתרופות: PTU (Propylthiouracil), Mercaptizol - יש להפסיק לקחת שבוע לפני הבדיקה בתאום עם רופא המשפחה.
- יש להפסיק לקחת Eltroxin 3-4 שבועות לפני הבדיקה בתאום עם רופא הממכון לרפואה גרעינית.
- אם בוצעה בדיקת CT, צנתור, אנגיוגרפיה, IVP עם הזרקת חומר ניגודי - יש להמתין חודשיים מביצוע הבדיקה ועד לביצוע בדיקת קליטת יוד רדיואקטיבי, מכיוון שהחומר הניגודי המוזרק יכול לשבש את תוצאות הבדיקה.

### תהליך הבדיקה

- תתבקש/י לבלוע קפסולה של יוד רדיואקטיבי במינן קטן.
- הבדיקה מתבצעת בשכיבה וכוללת שתי מדידות על ידי מכשיר הנצמד לצוואר.
- מדידה ראשונה מתבצעת שעתיים לאחר בליעת הקפסולה, ומדידה שנייה - 24 שעות לאחר בליעת הקפסולה.
- משך כל מדידה כ-2 דקות.
- משך זמן הבדיקה כשעתיים וחצי ביום הראשון ושעה עד שעה וחצי ביום השני.

### לאחר הבדיקה

- עליך להישאר בצום במשך שעה נוספת לאחר בליעת הקפסולה.
- תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 10 ימים.

### הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך - אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני מועד הבדיקה.

בברכת בריאות שלמה  
צוות המכון לרפואה גרעינית