



## דף הסבר

## טיפול בזבלין

### המכון לרפואה גרעינית

ליד חדרי לידה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400485

08-6400940

פקס. 08-6400765

### מטרת הטיפול

הטיפול ניתן למטופלים עם לימפומה פוליקולרית. החומר הרדיואקטיבי המוזרק קשור לנוגדן הפוגע בתאי המחלה.

### הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- שבוע לפני הטיפול וביום הטיפול - יש לקבל עירוי של מבטרה בתאום עם הרופא ההמטולוג.
- יש להצטייד בסטרואידים ואנטיהיסטמינים למקרה של תגובת רגישות.

### תהליך הבדיקה

- מזריקים חומר רדיואקטיבי דרך פילטר לתוך הווריד עד 8 שעות מהכנת התכשיר.
- משך זמן הטיפול כ-10 דקות.

### לאחר הטיפול

- במשך שבוע לאחר הטיפול יש להטיל שתן בשיבה ולאחר מכן לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון.
- יש לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון לאחר מגע עם דם או הפרשות.
- יש להשתמש בקונדום בעת קיום יחסי מין עד שבוע לאחר הטיפול.
- מומלץ להשתמש באמצעי מניעה לפחות שנה מתחילת הטיפול (גברים ונשים).
- אצל נשים תיתכן סבירות נמוכה לפגיעה בפוריות. אצל גברים, תיתכן פגיעה זמנית בפוריות, ובמקרים נדירים קיימת אפשרות לפגיעה קבועה.
- ייתכן ויופיע דיכוי מח עצם הפיך המתפתח בין 4-6 שבועות ממתן הטיפול ומגיע לשיא בין השבועות 7-9.
- רוב החולים שמפתחים טרומבופניה ונויטרופניה דרגה 3-4 מתאוששים לאחר 12 שבועות.
- לא צפויות תופעות לוואי חריפות.

### הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך - אסור להן לקבל את הטיפול.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני קבלת הטיפול.

בברכת בריאות שלמה  
צוות המכון לרפואה גרעינית