



דף הסבר

מיפוי יוד כל גופי

המכון לרפואה גרעינית

ליד חדרי לידה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400485

08-6400940

פקס. 08-6400765

מטרת הבדיקה

איתור מוקדים פתולוגיים בגוף.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- אם בוצעה בדיקת CT עם הזרקת חומר ניגודי - יש להמתין חודשיים מביצוע ה-CT ועד לביצוע הבדיקה עם חומר רדיואקטיבי, מכיוון שהחומר הניגודי עלול לשבש את תוצאות הבדיקה.
- Eltroxin - יש להפסיק לקחת 3-4 שבועות לפני הבדיקה בתאום עם רופא מהמכון לרפואה גרעינית.
- הכנה באמצעות תרופות תיעשה לפי שיקול דעתם של הרופא/ה במכון לרפואה גרעינית והרופא המטפל.

תהליך הבדיקה

- תתבקש/י לבלוע קפסולה של יוד רדיואקטיבי.
- כ-48-72 שעות לאחר נטילת הקפסולה מבצעים מיפוי.
- אם המטופל/ת קיבל/ה מנת טיפול של יוד רדיואקטיבי, המיפוי יתבצע כשבוע לאחר מתן הקפסולה.
- משך זמן המיפוי כ-40 דקות בשכיבה.

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 10 ימים.

הערות

- נשים בהריון, או אם קיים ספק לכך, או בתקופת הנקה - אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כן לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני ביצוע הבדיקה.

בברכת בריאות שלמה
צוות המכון לרפואה גרעינית