



דף הסבר

בדיקת אנטרוסקופיה

מטרת הבדיקה

אנטרוסקופיה הינה פעולה אנדוסקופית של מעי הדק המאפשרת הסתכלות ישירה לתוך חלל המעי הדק לצורך אבחנה וטיפול. הבדיקה מתבצעת באמצעות אנדוסקופ – צינור דק וגמיש הבנוי מסיבים אופטיים ומעטה פלסטי, עם מצלמה בקצהו ועוביו כ-10 מ"מ. האנדוסקופ מוחדר ללוע דרך הפה. לעיתים מתבצעות במהלך הבדיקה פעולות כמו ביופסיה או כריתת פוליפ.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- עליך להיות בצום מוחלט כ-8 שעות לפני הבדיקה.
- לקחת תרופות:
- אם הנך אלרגית לתרופות, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני ביצוע הבדיקה.
- אם הנך נוטל/ת תרופות כגון: קומדין, סינרומ - יש להפסיקן 7 ימים לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל. אין צורך להפסיק אספירין.
- למרות הצום, אם הנך סובל/ת מלחץ דם גבוה או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות עד 3 שעות לפני הבדיקה. (מותר לשתות מים עד 3 שעות לפני הבדיקה).
- לחולי סכרת: אסור להזריק אינסולין בבוקר יום הבדיקה, אך יש להביא את האינסולין ואת כרטיס המעקב לבדיקה.
- אנא לבש/י בגד נוח והשתדל/י להגיע ללא תכשיטים, בית החולים אינו אחראי לאובדנם.
- מאחר ותקבל/י זריקת טשטוש, חובה להגיע לבדיקה עם מלווה.
- אסור לנהוג ברכב לאחר ביצוע הבדיקה, למען בטיחותך.

תהליך הבדיקה

- על מנת להפחית את תחושת חוסר הנוחות בזמן הבדיקה, ירדימו את הלוע באמצעות תרסיס לידוקאין ו/או תינתן לך זריקת טשטוש לתוך הווריד.
- תתבקש/י לשכב על צד שמאל. האנדוסקופ יוחדר דרך הלוע, תתבקש/י לבצע פעולת בליעה ולנשום רגיל.
- משך הבדיקה כ-15 דקות.

לאחר הבדיקה

- לאחר הבדיקה תישאר/י להשגחה במכון עד להתאוששות.
- לאחר כשעה תוכל/י לשתות באישור הצוות המטפל. עם סיום הבדיקה יימסרו לך תוצאותיה ותקבל/י מכתב לרופא המטפל.
- הסיכונים והסיבוכים האפשריים מפורטים בטופס ההסכמה לבדיקה. על-פי החוק, חתימה על הסכמה לביצוע הפעולה מהווה תנאי הכרחי לביצועה.

בברכת בריאות שלמה

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

המכון

לגסטרואנטרולוגיה

ומחלות כבד

בניין אשפוז מחלקות פנימיות,

קומה ראשונה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400739

פקס. 08-6403179