

הכנה לבדיקת ברונכוסקופיה אולטרה סוניית (EBUS)

מטופל/ת יקר/ה,

הנך מוזמן/ת לבדיקת ברונכוסקופיה אולטרה סונית.

ברונכוסקופיה היא אחת מהבדיקות המסייעות לרופא לאבחן את הבעיה הריאתית שלך. את הבדיקה יבצע רופא, שיכניס אל קנה הנשימה צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו. הרופא יוכל לראות את הנעשה בדרכי הנשימה ומחוץ להן תחת הכוונה אולטרה-סונוגרפית ואף לקחת דגימה מממצאים מחוץ ובסמוך לקנה הנשימה, כדי להגיע לאבחנה מדויקת.

הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בהרדמה חלקית או בהרדמה כללית, על פי שיקולים רפואיים. יש לקרוא בעיון את "טופס הסכמה מדעת" שנשלח יחד עם הזמנה זו. לפני הבדיקה תתבקש/י לחתום על טופס זה לאישור ביצוע הבדיקה. החתימה תתבצע במעמד הבדיקה ולאחר הסבר חוזר של הרופא. אפשר לשאול ולהתייעץ עם הצוות הרפואי במכון בכל הקשור לבדיקה. במקרה שבו המטופל/ת אינו/ה כשיר/ה לחתום על הסכמה מדעת, נדרשת חובת נוכחות של אפוטרופוס ביום הבדיקה. על האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות.

ילדים עד גיל 18 חייבים להגיע עם הורה/ אפוטרופוס.

במקרה של פסול דין, חוסה ותשוש נפש יש לדאוג להסכמה לברונכוסקופיה והסכמה להרדמה ע"י אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט.

לבדיקה יש להביא את המסמכים הבאים

- טופס הזימון לברונכוסקופיה.
- טופס התחייבות (טופס 17) קוד : למבוטחי הכללית 55305, למבוטחי קופות אחרות 99235.
- סיכום רפואי מרופא משפחה המכיל מידע על מחלותיך ועל תרופות שאת/ה נוטל/ת.
- תוצאות הבדיקות הבאות :

1. ספירת דם – שבוצעה עד חודש לפני הבדיקה.
2. תפקודי קרישה (PTT/PT/INR) – מיומיים לפני הבדיקה.
3. אלקטרוליטים – שבוצע עד חודש לפני הבדיקה.
4. צילום חזה – שבוצע עד חודש לפני הבדיקה, אלא אם הרופא ציין אחרת.
5. CT בית החזה (דיסק + פענוח).
6. אק"ג – רק למטופלים מעל גיל 40, אלא אם הרופא ציין אחרת.
7. בדיקות נוספות, בהתאם להחלטת הרופא : _____

יש להביא לבדיקה את כל התרופות הקבועות שלך.

הוראות לקראת הבדיקה

- **נטילת תרופות :** לפני הבדיקה ובבוקר הבדיקה, יש להמשיך ולקחת את התרופות הקבועות כרגיל, עם מעט מים.
אם את/ה נוטלת תרופות לדילול דם ו/או נוגדות קרישה, כגון : פלביקס, קומדין, אספירין, קרטיה, יש להודיע לרופא המשפחה כ- 10 ימים לפני הבדיקה כדי שיתכנן אתך את הפסקת התרופה ומעבר לתרופה אחרת, אם צריך.
- אם את/ה סובלת מאלרגיה לתרופות, או ממחלה הגורמת לדימום, אם יש לך קוצב לב מלאכותי (PACEMAKER) חובה להודיע על כך לאחות במכון **לפחות שבוע** לפני הבדיקה.
- אם את/ה סובלת ממחלה מדבקת, נא הודיע/י לרופא/ה הבודק/ת.
- **צום :** אין לאכול ולשתות החל מחצות הלילה שלפני בוקר הבדיקה ולא פחות מ-6 שעות, אם הבדיקה נעשית בשעה אחרת ביממה. ניתן לשתות מים בכמות קטנה בלבד עד שעתיים לפני הבדיקה.
- אם את/ה סובלת מסוכרת, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת ולקבל הנחיות מדויקות כיצד לקחת את התרופות לסוכרת ביום לפני הבדיקה וביום הבדיקה (כולל התאמת מינון במטופלים באינסולין). הנחיות אלה חשובות למניעת ירידות ועליות חדות בסוכר, מצבים שעלולים לשבש ואף לדחות את הבדיקה.

ביום הבדיקה

- יש לצחצח שיניים.
- מומלץ להגיע ללא תכשיטים ודברי ערך.
- חובה להגיע לבדיקה עם מלווה שיוכל ללוותך לביתך לאחר הבדיקה. הבדיקה לא תתבצע ללא מלווה.

מהלך הבדיקה

- הבדיקה עצמה תיארך כ-30 דקות. במהלך הבדיקה תהיה בהשגחה מתמדת של צוות רפואי וסיעודי.

לאחר הבדיקה

- תישאר/י להשגחה בחדר ההתאוששות לפחות שעתיים.
 - המלווה ישהה לצדך בחדר ההתאוששות.
 - עד התאוששות מלאה, יש להמשיך את הצום, אלא אם ינחה הרופא אחרת.
 - על פי החלטת הרופא, לאחר הבדיקה תועבר להשגחה במכון/ במחלקה.
 - על-פי החלטת רופא יבוצע צילום חזה כביקורת לאחר הבדיקה.
 - אם יופיעו כאבים, תקבלי/י תרופות לשיכוך כאבים.
 - הצוות הרפואי ינחה אותך על המשך נטילת התרופות הקבועות.
- מועד שחרורך מבית החולים יקבע לפי מצבך הרפואי ועל פי החלטת רופא. לרוב השחרור מתבצע ביום הבדיקה.

הנחיות והוראות לקראת השחרור

- בסיום הבדיקה ימסרו לך תוצאותיה ותקבל מכתב לרופא המטפל. תוצאות הבדיקה תישלחנה גם לרופא המטפל, בתוך 10 ימים.
- ניתן ליטול משככי כאבים על-פי ההוראות בשחרור.
- שחרור מהמחלקה יעשה רק עם המלווה.
- מומלץ לא לבצע פעולות הדורשות ערנות וחדות חושים כמו חתימה על מסמכים חשובים ב- 24 השעות שלאחר הבדיקה.
- מומלץ לא לנהוג ברכב כ-8 שעות לאחר הבדיקה.
- במשך יממה לאחר הבדיקה - מומלץ לא לעשן.
- אין להישאר לבד בבית עד הבוקר שלמחרת הבדיקה.
- תיתכן ליחה דמית, שיעול, קושי בבליעה או כאבי גרון. תופעות אלו יחלפו תוך כמה ימים.
- לאחר הבדיקה תקבלי זימון לביקורת במרפאת ריאות.

יש לפנות באופן מידי לרופא במקרים הבאים

- בכל החמרה בכאבים, לחץ מוגבר בחזה או קושי בנשימה.
- אם החום עולה מעל 38 מעלות.
- אם מופיע דימום מוגבר בשיעול או אם מופיעה ליחה דמית מוגברת יש להתקשר או להגיע לחדר מיון בבית החולים שבו ביצעת את הבדיקה, לשם בדיקתך ולקבלת טיפול רפואי בהתאם לצורך.

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה

צוות מכון/מחלקת ריאות

”חשוב להיות שותף פעיל- לטיפול מוצלח ויעיל” -

שאל אותי 3 שאלות :

1. מה הבעיה הרפואית שלי ? 2. מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה ? 3. למה חשוב שאעשה את זה ?