

איך תדעו שתינוקכם שומע אתכם?

בדיקת שמיעה בילודים



כתיבה:

לאה מרום, קלינאית תקשורת ארצית (מבוסס על גרסה שנכתבה במקור על ידי טובה ארצי)

ייעוץ מקצועי (לפי סדר א"ב):

הדס בן סימון, יפעת בן לולו, רויטל גורלי, ד"ר קרלוס גרוזמן, צופית דהן, ד"ר איתן וירטהיים, ד"ר זאב חורב, גורגינה כהן גורדון, פרופ' דיאן לוין, לילי פרלמן, כלנית קיי, פנינה ריכטר, ד"ר פוריה שחף.

עריכה וריכוז הפקה:

שוש גן-נוי, ענתי יום-טוב, המחלקה לחינוך וקידום בריאות

ההנהלה הראשית

חטיבות הקהילה ובתי חולים -

האגפים לרפואה ולסיעוד

המדור לקלינאות תקשורת

המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 clalit.co.il *2700

ברום אפורי מנ"ט 1000052586



© כל הזכויות שמורות 2024



צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

הורים יקרים!

מזל טוב להולדת בונכם/בתכם.

טרם השחרור הביתה מבית-החולים, עובר כל תינוק שזה עתה נולד, סדרת בדיקות.

בדיקות אלו כוללות בין השאר בדיקה לאיתור ירידה בשמיעה ביילודים, כפי שמקובל במרכזים רפואיים גדולים ברחבי העולם. בדיקה זו כלולה בסל הבריאות ומבוצעת ללא תשלום.

מהי הבדיקה?

בדיקה לאיתור ירידה בשמיעה ביילודים היא בדיקה שמטרתה לאתר ליקוי שמיעה מולד.

הבדיקה מורכבת משני שלבים: בדיקת "פלט אקוסטי" (OAE) המבוצעת לכל היילודים, ובדיקת "רישום פוטנציאלים מעוררים" (AABR) המבוצעת בהתאם לצורך.

מדוע חשוב לבצע את הבדיקה?

שמיעה תקינה חיונית להתפתחות כישורי שפה ותקשורת.

חשוב לבצע את הבדיקה מוקדם, כדי לאתר בזמן ירידה בשמיעה, ובכך לאפשר התחלה מוקדמת של שיקום שמיעתי והתערבות טיפולית במידת הצורך.

כיצד מבוצעת הבדיקה?

הבדיקה פשוטה ומתבצעת באמצעות אוזניות המחוברות למכשיר המשמיע צלילים. בעת השמעת הצלילים, המכשיר רושם את תגובת אוזניו של התינוק לצלילים. אם לא מתקבלת תגובה לצלילים בבדיקה זו, נערכת בדיקה נוספת במהלך השעות בבית-החולים.

הבדיקות מבוצעות באחריות קלינאית תקשורת.

כמה זמן אורכת הבדיקה?

הבדיקה קצרה ונמשכת דקות ספורות.

היכן ומתי מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת במתחם מחלקת ילודים, במהלך השעות של התינוק בבית-החולים לאחר הלידה.

אם הבדיקה לא בוצעה מסיבה כלשהי, או שנדרשת השלמתה, חשוב להגיע לביצוע הבדיקה בבית-החולים בו נולד התינוק.

האם הבדיקה מסוכנת?

הבדיקה היא חיצונית, אינה חודרנית ואין לה כל תופעות לוואי. הבדיקה נעשית בתנאי שקט מתאימים, כאשר התינוק רגוע או ישן, ואינן כרוכות בכאב או באי נעימות.

חשוב לדעת

גורמים שונים יכולים להשפיע על תוצאות הבדיקה - חסימה של תעלת השמע באוזן עקב הצטברות לכלוך או נוזלים האופייניים לימים הראשונים לאחר הלידה, תינוק שאינו רגוע בעת הבדיקה ועוד. ייתכן שאצל חלק מהתינוקות לא יתקבלו תגובות כמצופה, למרות ששמיעתם תקינה.

במידה והתינוק לא עבר את בדיקת השמיעה במחלקת היילודים בבית-החולים, או שיש גורמי סיכון לליקוי שמיעה - הוא יופנה לרופא הילדים, שידאג להמשך ברור ומעקב, במסגרת ובאחריות קופת-החולים בה התינוק מבוטח.

לשאלות ולברורים ניתן לפנות לצוות המחלקה.

