

## דף מידע לגבי ילד המקבל סדציה (טשטוש) עם דורמיקום

ילדך מקבל כעת תרופה בשם דורמיקום במתן דרך הפה או דרך האף. מטרת התרופה הינה להפחית חרדה ופחד. התרופה גורמת לשכחה בזמן פעילותה וכתוצאה מכך מונעת מהילד חוויה שתיזכר כאירוע שלילי. את התרופה יש לתת לילדך בתוך המחלקה, עדיפות בחדר או באזור שקט.

מיד עם מתן התרופה חובה לשמור על מספר כללים:

- ❖ אסור להשאיר את הילד ללא השגחה, אפילו לא לרגע.
- ❖ אין לתת לילד ללכת או לשבת ללא השגחה. עדיפות לשכיבה במיטה עם דפנות מורמות, או בעגלה חגור, או בידיים של ההורים (מחשש לנפילה עקב חוסר יציבות).
- ❖ אין לתת לילד אוכל או שתייה.

### משך השפעת התרופה:

❖ במתן דרך הפה – התרופה מתחילה להשפיע תוך מספר דקות, שיא הפעולה מושג לאחר 20-30 דק'. ההשפעה תפוג לרוב בטווח של עד 90 דקות. יש מצבים בהם ההשפעה ממושכת יותר, בעיקר כאשר הילד עייף.

❖ במתן דרך האף – התרופה מתחילה להשפיע תוך מספר דקות, שיא הפעולה מושג תוך 10 דקות. ההשפעה עשויה להימשך עד 90 דקות ולעיתים אף יותר מכך.

לאחר ביצוע הפעולה הרפואית לשמה ניתן הטשטוש הילד יישאר להשגחה עד להתעוררות מלאה. מתן שתייה נעשה רק לאחר אישור צוות סיעודי/ רפואי.

הילד ישוחרר לאחר חזרתו למצבו הרגיל מבחינת הכרה, הליכה ושתייה.

לעיתים רחוקות התרופה גורמת להשפעה הפוכה (פרדוקסלית) ומעוררת אי שקט ניכר. במצבים אלו יש לנסות לעזור לילד להירגע על ידי השארתו בחדר שקט, דיבור רגוע וחיבוק. אין צורך להילחץ מהמצב. מצב זה אינו נעים אך חולף מעצמו.

בברכת רפואה שלמה,

צוות מלר"ד ילדים במרכז רפואי העמק