

המכון לגסטרואנטרולוגיה
השירות להפרעות תנועה של מערכת העיכול
טלפון: 04-6495748

הנחיות לקראת בדיקת לחצים בוושט (מנומטריה וושטית)

מהי הבדיקה?

בעזרת מדידת הלחצים בוושט ניתן לבדוק את תנועתיות הוושט ואת תפקוד סוגרי הוושט במנוחה ובעת בליעה.

הבדיקה נעשית לברור המצבים הבאים:

- הפרעות בליעה.
- כאבי חזה שאינם ממקור לבבי.
- צרבת קשה הנגרמת מ-REFLUX (החזר קיבתי-וושטי).
- הערכה טרום ניתוחי וושט

הכנה לבדיקה:

יומיים טרם הבדיקה

- הפסקת נטילת תרופות נגד בחילות כגון: פרמין, זופרן, מוטיליום ותרופות דומות.
- הפסקת נטילת תרופות המכילות ניטרטים כגון: מונוניט, איזטרד, מגלט ותרופות דומות.

ביום הבדיקה

1. צום של 6 שעות לפני הבדיקה
2. חצי שעה לפני המועד שנקבע, יש להגיע למרפאת הפרעות תנועה של מערכת העיכול, בנין מס' 3, קומה 3, חדר 9 במרכז רפואי העמק.
3. יש להביא תעודה מזהה וטופס התחייבות (טופס 17) עבור קוד בדיקה – **69507**
4. מותר לקחת תרופות קבועות עם מעט מים, למעט התרופות שהוזכרו לעיל.

מהלך הבדיקה

בתחילת הבדיקה יינתן אלחוש מקומי לחלל האף ולאחריו תוחדר צינורית דקה וגמישה עם חיישנים דרך האף אל הוושט. תהליך החדרת הצינורית אורך מספר שניות ואינו מלווה בכאב, אך עלול לגרום תחושת אי נוחות.

באמצעות הצינורית, נמדדים הלחצים המופעלים על ידי שרירי הוושט. תוצאות המדידה מועברות למערכת ממוחשבת ומתורגמות לתרשים.

פרט לרישום הלחצים בוושט במנוחה, נמדד גם תפקוד הוושט בעת מספר בליעות של מים בכמות קטנה.

משך הבדיקה כ-30 דקות.

כשעה לאחר הבדיקה ניתן לשתות ולאכול ללא כל מגבלה.

בתום הבדיקה מתקבל תרשים לחצים העובר פענוח על ידי רופא גסטרו. ממצאי הבדיקה וההמלצות להמשך טיפול יישלחו לנבדק. להשלמת תהליך הברור יש לקבוע תור לרופא המפנה.

חשוב לדעת: מהימנות הבדיקה תלויה ביישום הוראות ההכנה שלעיל לכן אנא הקפד על מילוי הוראות אלה כלשונן!

בכל שאלה נשמח לעמוד לרשותך בטלפון: 04-6495748

בהצלחה!

*מטעמי נוחות, המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד.