



# דף הסבר ל- Ballon Mitral Valvuloplast

## טיפול הרחבת מסתם

### גברת / אדון נכבדים

הרחבת מסתם בעזרת בלון (BMV) מהווה כיום שיטה חליפית לפרוצדורה ניתוחית בחלק מהחולים הסובלים מהיצרות מיטרלית Mitral stenosis .

**מטרת הפעולה:** להרחיב את המסתם המוצר ובעקבות כך לשפר את איכות החיים של המטופל. הפעולה מתבצעת בחדר הצנתורים בימים ג' או ה' בשעות הבוקר ואורכת כשעה עד שעה וחצי. הפעולה מתבצעת בהרדמה מקומית בלבד ועליך לשתף פעולה עם הצוות הרפואי.

במהלך הפעולה מחדירים צינוריות דרך המפשעה ודרכם מעבירים את הצנטרים ואת הבלון. בהמשך משקפים באמצעות קרני רנטגן ומסריטים על גבי סרט צנתור את מהלך הפעולה, תוך כדי מתן חומר ניגודי.

בזמן ניפוח הבלון תידרש להשתעל על פי בקשת הרופאים, השיעול מגביר את הדופק. ייתכן שיופיעו תופעות של כאבים בחזה, תעוקה, אי נוחות, בחילה או סחרחורת, זה חולף לאחר מספר שניות ויש לדווח על כך מיד.

לאחר גמר הטיפול תועבר למחלקה להמשך מעקב והשגחה.

על מקום הצנתר במפשעה שמים חבישה ושק חול ל-6 שעות כדי למנוע דימום ונשאים בשכיבה עד הבוקר.

**לפני הפעולה:** תוזמן/י לבדיקות דם ומתן טיפול תרופתי לפי הצורך, וכך תבוצע בדיקת אולטרא סאונד דרך הוושט (TEE).

**למחרת הפעולה:** תבוצע בדיקת אקו במכון הלב להערכה נוספת של תפקוד המסתם.

**המעקב:** יבוצע במרפאה האזורית וכן במרפאה הקרדיולוגית בבי"ח העמק. לפני השחרור הביתה תקבלי מכתב מהרופא ובו הנחיות להמשך הטיפול התרופתי, מעקב אחר קרישה וחזרה הדרגתית לתפקוד יומי.

יש לחזור על בדיקת TEE כעבור 3 חודשים.

### הערות

- במידה ואתה רגישה/ה ליוז, עליך לדווח לרופא ולקבל טיפול תרופתי מתאים.
- אם אתה מקבל קומדין יש להפסיק את התרופה כ-10-5 ימים לפני הטיפול, לפי הנחיות הרופא המטפל.

**צוות מכון הלב מאחל לך רפואה שלמה ובהצלחה.**