

ניקור מתני L.P.- LUMBAR PUNCTURE

בדיקת תכולתו של נוזל השדרה המקיף את המוח וחוט השדרה, מאפשרת קבלת מידע על מערכת העצבים. הבדיקה מבוצעת על-מנת לדגום את נוזל השדרה באמצעות מחט המוחדרת בין חוליות הגב התחתון (בדומה להרדמה אפידורלית הנהוגה במהלך לידות ובפעולות לשיכוך כאב). הנוזל הנלקח לבדיקה הינו מועט וכולו נוצר מחדש תוך מספר דקות. הבדיקה אינה מותירה שום נזק.

מטרת הבדיקה: אבחון מחלות מוח, חוט שידרה ועצבים פריפריים

מקום ביצוע הבדיקה: מיטת החולה

תהליך הבדיקה:

הבדיקה מבוצעת על ידי רופא. תתבקש לשכב על הצד כאשר סנטרך מוצמד לבית החזה ורגליך מקופלות אל דופן הבטן. תנוחה זו חיונית על מנת שהבדיקה תבוצע בהצלחה מרבית. הרופא יחטא את מקום הדיקור, יזריק תחילה חומר אלחוש לאזור הדקירה ורק לאחר מכן יבצע את הדיקור. לאחר שהמחט תגיע למקום הרצוי תיערכנה מדידות לחץ ותיאספנה דגימות נוזל לבדיקות הנחוצות. בסיום הבדיקה תוצא המחט, לאחר מכן תוצמד מדבקת חבישה סטרילית על אזור הדקירה, אין להרטיב את האזור למשך 24 שעות.

הכנה לבדיקה:

- עלייך להיות בצום לפני הבדיקה ולדווח לרופאים אם ידועה לך רגישות לתרופות המשמשות לאלחוש מקומי
- קרוב לשעת הבדיקה מומלץ לרוקן את שלפוחית השתן
- ממומלץ להתקלח לפני הבדיקה, כיוון שלאחר הבדיקה תתבקש לנוח

לאחר הבדיקה:

- עלייך לשכב בנוח במיטה במשך שעתיים עד שלוש שעות.
- להקפיד על שתייה מרובה.
- במהלך המשמרת תגיע אחות להתעניין בשלומך ולוודא כי הטלת שתן לאחר הבדיקה.
- יש להימנע ממאמצים במשך 24 שעות שלאחר הבדיקה.
- אין להסיר או להרטיב את המדבקה מאזור הדקירה למשך 24 שעות.

האם קיימים סיבוכים לבדיקה?

הסיכון השכיח הינו האפשרות לכאב ראש זמני. במידה ויתפתחו כאבי ראש מומלץ לשכב במיטה במשך 24 שעות ו/או עד חלוף התופעה. הקפדה על שתייה מרובה עשויה להקל על כאבי הראש, ניתן לפנות לאחות ולבקש כדור להקלה על כאבי הראש.

בברכת החלמה מהירה מצוות המחלקה לנירולוגיה העמק.

*הכתוב מתייחס לגברים ונשים כאחד

במידה והנך מעוניין בקבלת מידע נוסף אל תהסס לפנות אלינו, 04-6495733