

תאריך: _____

טופס הזמנה לבדיקת תגר מטכולין

שם: _____

שם משפחה: _____

ת"ז: _____

מטופל/ת יקר/ה,

הינך מוזמן/ת לביצוע בדיקת תגר מטכולין. מטרת הבדיקה הינה לבדוק נטיית הסמפונות להתכווצות יתר (תגובתיות יתר של הסמפונות) בתגובה לגירוי חיצוני.

הבדיקה נמשכת כחצי שעה ומתבצעת ע"י מדידת תפקודי הריאות לנוכח ריכוזים עולים של מטכולין. הבדיקה מופסקת אם מתקבלת תגובה אסתמטית (כיווץ הסמפונות) ואז היא מוגדרת "חיובית". במקרה שלא התקבל כיווץ משמעותי של הסמפונות, גם לנוכח הריכוזים הגבוהים ביותר של המטכולין, הבדיקה מוגדרת כ"שלילית".

לביצוע הבדיקה, יש להצטייד בטופס התחייבות (טופס 17) המיועד לבדיקה זו. קוד הבדיקה למבוטחי כללית - 76118 ולמבוטחי קופות אחרות - 94070.

הוראות לפני הבדיקה

- יש להפסיק נטילת מרחיבי סמפונות מסוג ונטולין/ בריקלין כ-6 עד 8 שעות לפני הבדיקה
- יש להפסיק מרחיב סמפונות מסוג ארוונט כ-24 שעות לפני הבדיקה
- יש להפסיק את התרופות הבאות כ-48 שעות לפני הבדיקה: סרוונט, סמביקורט, פורדיל, קיו-ואר בודיקורט, פליקסוטטיד, מיפלונייד, סרטייד, אוקסיס, אונברז
- תרופות להקלת צינן ואלרגיה ותרופות המכילות אנטיהיסטמינים - יש להפסיק כ-48 שעות לפני הבדיקה
- כשבוע לפני הבדיקה יש להפסיק ספיריבה
- אין לבצע את הבדיקה במקרים הבאים:
 - אם את/ה נוטל תרופות מקבוצת חוסמי בטא
 - אם את בהריון או מניקה
 - כשקיים חשד לאפילפסיה, מחלה קרדיו וסקולרית, כיב כפטי, מחלת בלוטת התריס ו/או חסימה בדרכי השתן
 - אם חלית בשפעת בארבעה שבועות האחרונים
- אין לעשן, לבצע פעילות גופנית, לשתות משקאות המכילים קפאין כגון קולה שוקולד כ-6 שעות לפני הבדיקה
- השתדלי להימנע מחשיפה לאלרגנים ידועים כ-24 שעות לפני הבדיקה.
- אין צורך להיות בצום

לצורך דחיית הבדיקה או בכל שאלה, ניתן להתקשר למכון הריאות בטלפון: 08-9441437

בברכה

צוות המכון למחלות ריאה
מרכז רפואי קפלן

מצוינות רפואית קרובה לבית

רפואה קרובה. מרכז רפואי קפלן ת.ד. 1 רחובות מיקוד 76100
טלפון 08-9441437 פקס 08-9441063 www.KMC.org.il

שם הטופס: LUN-Metacolin-0007-23072014.docx

