

# MOVIPREP® موثيبريب®

ما هو فحص الكولونوسكوبيا؟

كولونوسكوبيا هو إجراء طبي اعتيادي شائع الذي يستعمل من أجل فحص المصران الغليظ. يقوم الطبيب من خلال هذا الفحص بالنظر إلى داخل المصران بواسطة أنبوب بلاستيكي مرن ورفيع في طرفه كاميرة فيديو صغيرة التي يتم إدخالها بلطف عن طريق فتحة الشرج.

يسمح الفحص بالنظر بشكل مباشر إلى جوانب المصران الغليظ، أخذ عينات (خزعات)، أو إزالة بوليب (ورم الذي عادة ما يكون حميداً وينمو من الطبقة الداخلية للمصران) حسب الحاجة. يتم القيام بالفحص عادة تحت تأثير التخدير (في بعض الأحيان تخدير شامل) ويستغرق نحو ٣٠ دقيقة حتى ساعة.

من بعد الانتهاء من الفحص سوف تظل/تظلين لمدة نحو ساعتين للمراقبة حتى يختفي أثر مادة التخدير. من بعد ذلك سوف يكون بوسعك أن تأكل/تأكلي وتشرب/تشربي كالمعتاد.

## التحضير للفحص:

كي يكون الفحص ناجحاً ويتمكن الطبيب من رؤية جوانب المصران بوضوح، يجب أن يكون المصران خالياً، لذلك يجب إتباع تعليمات استعمال المستحضر كما هي مفصلة فيما يلي في نشرة المستهلك المرفقة بالعبوة. في حال لديك أسئلة الرجاء استشارة الطاقم الطبي من وحدة التنظير التي يفترض أن تجري/تجرين فيها الفحص.

من المهم الذكر بأن مدة الفحص ونجاحها تتأثر بحسن التحضير ومستوى نظافة المصران. في حال أن المصران ليس نظيفاً بما يكفي، قد تكون هناك حاجة لتكرار الفحص في موعد آخر.

## معلومات عامة:

- قبل الفحص بيوم ينصح بتجنب تناول مأكولات غنية بالألياف ويجب التوقف عن استهلاك طعام صلب قبل ساعة من بداية استعمال موثيبريب وحتى الانتهاء من القيام بالفحص.
- يجب توقع حدوث تبرز بوتيرة عالية وعلى شكل سائل- الرجاء التأكد من أنه يمكن الذهاب للمرحاض في كل وقت من بعد تناول موثيبريب.
- من أجل إرجاع السوائل التي يفقدها الجسم ومنع حدوث جفاف، يجب الحرص على استهلاك سوائل صافية بكمية كبيرة، ينصح بشكل خاص شرب عصائر الفاكهة صافية، حساء صافي، قهوة أو شاي من دون حليب.
- من المهم التوقف عن تناول سوائل يشمل في ذلك موثيبريب، قبل ساعة واحدة على الأقل من القيام بفحص الكولونوسكوبيا.
- من بعد تحضير المحلول يمكن حفظه مغطى لمدة ٢٤ ساعة بدرجة حرارة أقل من ٢٥ مئوية أو في الثلاجة بدرجة حرارة ما بين ٢-٨ مئوية. الحفاظ على المحلول في الثلاجة قبل الاستعمال يحسن بشكل ملحوظ من المذاق.
- يجب الوصول إلى الفحص ومعك مرافق- يمنع القيادة حتى ١٢ ساعة من بعد الفحص.
- عليك التمعن بنشرة المستهلك الخاص بموثيبريب قبل الاستعمال!



# MOVIPREP® موفيريپ

## تعليمات الاستعمال:

موفيريپ معد لتنظيف الأمعاء قبل القيام بأي إجراء إكلينيكي في منطقة المصران الذي يجب تنظيفه قبل القيام بهذا الإجراء. موفيريپ هو مستحضر بطعم الليمون الذي يحوي ٤ أكياس مسحوق من نوعين، كيسين كبيرين رقم ١ وكيسين صغيرين رقم ٢. من أجل إتمام علاج واحد نحن بحاجة للأكياس الأربعة.

## جرعة:

سوف يقوم الطبيب بتوجيهك بالنسبة لكيفية الاستعمال والجرعة التي ينصح بها. الجرعة التي ينصح بها في غياب تعليمات أخرى من الطبيب:  
الجرعة التي ينصح بها هي لترين من المحلول المحضر. يجب إنهاء العلاج بموفيريپ على الأقل ساعة واحدة قبل تنفيذ الفحص.

## يمكن تناول موفيريپ بطريقتين:

١. لتر من المحلول الجاهز من موفيريپ في المساء الذي يسبق القيام بالفحص ولتر آخر من المحلول المحضر من موفيريپ مبكراً في الصباح قبل تنفيذ الفحص.
٢. لترين من المحلول المحضر من موفيريپ في المساء قبل تنفيذ الفحص.

تناول الجرعة الأولى: تاريخ \_\_\_\_\_ ساعة \_\_\_\_\_

## مرحلة ١: تحضير المحلول

يجب ضم محتوى الكيسين، كيس رقم ١ وكيس رقم ٢ في وعاء قياس وإضافة الماء من أجل استكمال الحجم حتى يبلغ لتر من المحلول. يجب تحريك المسحوق بالماء جيداً حتى الذوبان بشكل كامل والحصول على سائل صافي أو ضبابياً بعض الشيء. يستغرق إجراء تذويب المسحوق في الماء نحو خمس دقائق. (ملاحظة: في حال أنه لا يوجد لديك وعاء للقياس - لتر ١ ماء = ٤ كؤوس ماء).

## مرحلة ٢: شرب المحلول

يجب شرب اللتر الأول من المحلول على مدار ساعة حتى ساعتين. يجب محاولة شرب كأس من المحلول المحضر كل ١٠-١٥ دقيقة. ينصح بشدة مرافقة العلاج بموفيريپ بشرب لتر إضافي (نصف لتر من بعد الجرعة الأولى ونصف لتر من بعد الجرعة الثانية) من سائل صافي أياً كان في كل وقت يلائمك، على سبيل المثال: ماء، عصير فاكهة من دون أجزاء فاكهة، حساء صافي، قهوة أو شاي من دون حليب، وكذلك مشروبات خفيفة، وهذا من أجل منع حالة ظمأ وجفاف.



اشرب/ي



اخلط /ي



اضف لتر ماء  
كيس رقم ٢



اضف محتوى  
كيس رقم ١



اضف محتوى



تناول الجرعة الثانية: تاريخ \_\_\_\_\_ ساعة \_\_\_\_\_

- مرحلة ٣: كرر ما هو موصوف في المرحلة ١ مع الأكياس المتبقية في العبوة (كيس رقم ١ وكيس رقم ٢).  
مرحلة ٤: كرر ما هو موصوف في المرحلة ٢.

يجب التوقف عن تناول سوائل بما في ذلك موفيريپ، قبل ساعة واحدة على الأقل من القيام بفحص الكولونوسكوبيا.

