

# MOVIPREP® Мовипреп®

## Что такое колоноскопия?

Колоноскопия – это стандартная и широко распространённая медицинская процедура, применяющаяся для обследования толстой кишки. Во время анализа врач осматривает внутренности кишечника с помощью тонкой и гибкой пластмассовой трубки, на конце которой находится крошечная видео камера. Пластмассовая трубка осторожно вводится через задний проход. Данное исследование позволяет увидеть непосредственно стенки толстой кишки, сделать забор образцов (биопсия) или, в случае необходимости, удалить полип (опухоль, обычно доброкачественная - разрастание слизистой оболочки (внутреннего слоя) кишечника). Обычно данное исследование проводится в состоянии спутанности сознания (иногда – под общим наркозом) и длится от 30 минут до 1 часа.

По окончании анализа, в течение приблизительно 2-х часов, до окончания действия вещества, (приглушающего) сознание, Вы останетесь под медицинским наблюдением. Затем Вы сможете есть и пить, как обычно.

## Подготовка к проведению исследования:

Чтобы анализ прошел успешно, и у врача была возможность ясно увидеть стенки кишечника, он должен быть опорожнен. Поэтому, важно следовать указаниям по применению лекарственного препарата, изложенным далее для ознакомления в листке для потребителя, прилагаемого к упаковке. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, посоветуйтесь с медицинским персоналом отделения эндоскопии, в котором Вам предстоит сделать исследование.

**Важно отметить, что продолжительность исследования и его удачное проведение зависят от качества подготовки и очистки кишечника.**

**Если кишечник недостаточно чист, может возникнуть необходимость в повторном исследовании в другое время.**

## Общая информация:

- За день до исследования рекомендуется воздерживаться от потребления пищи, богатой пищевыми волокнами, и следует полностью прекратить потребление твёрдой пищи за 1 час до начала приема Мовипрепа и до окончания исследования.
- Ожидается, что стул будет жидким и частым – пожалуйста, удостоверьтесь, что в любое время после приёма Мовипрепа Вы будете находиться недалеко от туалета. .
- Для восстановления утраченной жидкости в организме и во избежание обезвоживания, необходимо в большом объеме потреблять прозрачную жидкость. Особенно рекомендуется пить прозрачные фруктовые соки, бульон, кофе или чай без молока.
- Важно прекратить потребление жидкости, включая Мовипреп, по крайней мере, за 1 час до проведения исследования колоноскопии.
- После приготовления раствора, его можно хранить, накрыв, в течение 24 часов при температуре ниже 25С 0 или в холодильнике при температуре 2 - 8С 0. Хранение раствора в охлаждённом состоянии перед употреблением значительно улучшает его вкус. На исследование следует явиться с сопровождающим – **в течение около 12 часов после проведения исследования воспрещается водить транспортное средство.**
- **Необходимо ознакомиться с листком для потребителя Мовипреп перед употреблением!**



# MOVIPREP® Мовипреп®

## Инструкция по употреблению:

Мовипреп предназначен для очистки кишечника перед любой клинической процедурой в области толстого кишечника, обязательным условием которой является полное опорожнение кишечника перед ее проведением. Мовипреп - это препарат со вкусом лимона, состоящий из 4 пакетов с порошком двух видов: двух больших пакетов под номером 1 и двух маленьких пакетов под номером 2. Для завершения одной процедуры требуются 4 пакета.

## Дозировка:

Врач предоставит Вам инструкции по употреблению и рекомендуемой дозировке. Общепринятая дозировка при отсутствии других рекомендаций врача:

Рекомендуемая доза составляет 2 литра готового раствора. Прием Мовипрепа необходимо завершить не позднее, чем за 1 час до проведения исследования.

Приём Мовипрепа может осуществляться двумя способами:

1. Литр готового раствора Мовипреп в вечернее время перед проведением исследования и, дополнительно, 1 литр готового раствора Мовипреп рано утром перед проведением исследования.

2. Два литра готового раствора Мовипреп в вечернее время перед проведением исследования.

Приём первой порции: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

## 1-й этап: приготовление раствора

Следует добавить содержимое двух пакетов, пакета номер 1 и пакета номер 2, в измерительную посуду, и добавить воду, чтобы получился 1 литр раствора. Следует хорошо размешать порошки в воде до их полного растворения и образования прозрачной или слегка мутной жидкости. Процесс растворения порошка в воде может длиться около пяти минут.

(Примечание: если у Вас нет измерительной посуды – 1 литр воды = 4 стакана воды).

## 2-й этап: приём раствора

Необходимо выпить первый литр раствора в течение 1 – 2 часов.

Старайтесь выпивать стакан готового раствора каждые 10 – 15 минут.

Убедительно рекомендуем в дополнение к приёму Мовипрепа выпить еще 1 литр дополнительно (пол-литра после первой дозы и пол-литра после второй дозы) любой прозрачной жидкости в любое удобное для Вас время, например: воду, фруктовый сок без частиц фруктов, бульон, кофе или чай без молока, а также легкие напитки. Цель - избежать состояния жажды и обезвоживания.



Добавьте содержимое пакета номер 1



Добавьте содержимое пакета номер 2



Добавьте литр воды



Размешайте



Выпейте

Приём второй порции: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

**3-й этап:** повторите процедуру, описанную в 1-м этапе, используя пакеты, оставшиеся в упаковке (пакет номер 1 и пакет номер 2).

**4-й этап:** повторите процедуру, описанную во 2-м этапе.

**Необходимо прекратить приём жидкостей, включая Мовипреп, не позднее, чем за один час до проведения исследования колоноскопии.**