

Отделение гастроэнтерологии

Медицинский центр "Меир"

Больничная касса "Клалит"

Правила подготовки к колоноскопии с препаратом "Мерокен"

Имя _____ Дата _____ Время _____

Вы приглашены на проверку колоноскопия которая позволяет врачу видеть ваш толстый кишечник. Проверка производится посредством введения тонкого гибкого шланга состоящего из оптических волокон через анальное отверстие в пространство толстого кишечника. Во время проверки, в случае надобности, есть возможность взять биопсию или провести процедуры такие как удаление полипа. Продолжительность проверки 30 минут.

Вам следует принести с собой обязательство по оплате (тофес 17). По приходу в отделение вам следует обратиться в регистратуру. Как при любой инвазивной процедуре вас попросят подписать согласие на процедуру, как условие к её проведению. Перед началом процедуры вы получите легкую седацию которая предотвратит неприятные ощущения связанные с процедурой. В связи с этим следует прийти с сопровождающим. Запрещено водить машину в течении суток. **Без присутствия сопровождающего вы не сможете зайти на процедуру.**

В рамках подготовки к колоноскопии вам следует выполнять следующие правила:

5 дней до проверки	Прекратить прием препаратов железа. Если вы принимаете препараты для разжижения крови: Комадин, Плавикс, Прадакса следует посоветоваться с вашим лечащим врачом о возможности их прекращения за 5 дней до процедуры или их замене на препарат Клексан (в уколах) за 12 часов до процедуры. Нет надобности прекращать прием Аспирина. Диабетикам следует согласовать дозу принимаемых препаратов, включая Инсулин, с лечащим врачом
За 2 дня до проверки	Следует избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием отходов: овощи, фрукты, черный хлеб, кукуруза, бобовые, семечки и орехи. Можно есть макаронные изделия из белой муки, молочное, курицу, рыбу, яйца, белый хлеб. Следует пить много жидкости.
За 2 дня до проверки	2 таб Лаксадин в 19:00

	בדיקה לפני ארוחה (עד 12:00)	בדיקה אחרי ארוחה (אחרי 12:00)
הפסקת אכילה	על 12:00 יום לפני בדיקה	על 16:00 יום לפני בדיקה
1 טבל. פראמין	על 13:00 יום לפני בדיקה	על 17:00 יום לפני בדיקה
1.5 ליטרים מרוקן התרופה מרוקן צריכה להימנע מלשתות במים קרים כוס אחת כל 10-15 דקות.	על 14:00 יום לפני בדיקה	על 18:00 יום לפני בדיקה
1 טבל. פראמין	על 20:00 יום לפני בדיקה	על 7 שעות לפני בדיקה
1.5 ליטרים מרוקן	על 21:00 יום לפני בדיקה	על 8 שעות לפני בדיקה
2 טבל. לוקסאדין	על 21:00 יום לפני בדיקה	

שתיים שעות לפני הבדיקה צריכה להימנע מאכילה.

אסור לקחת תרופות במקרה שיש ידועה אלרגיה להן או אחת מהרכיבים.

אחרי סיום הבדיקה תישאר תחת מעקב צוות הרפואה בהתאמה למצבך, אחר כך הרופא ידבר איתך על תוצאות הבדיקה.

מיקום המעבדה: בית החולים "מאיר" מח. גסטרו־אנטרולוגיה, בניין "סולברג" על המדרגות, קורידור שמאל מן המדרגות.

על שאלות כלליות לפנות למרשם המחלקה על טל. 09-7472580 פקס 09-8648406

דואר אלקטרוני gastromeirpn@clalit.org.il