

## הוראות לאחר בליעת קפסולה

1. אין לשתות ולאכול במשך שעתיים לאחר בליעת קפסולה. לאחר השעתיים ניתן לשתות אך ורק מים. 4 שעות לאחר בליעת הקפסולה מותר לאכול גבינות בצבע לבן או פיתה עם חמוס. בגמר הבדיקה ניתן לשוב לתזונה רגילה.
2. לאחר בליעת הקפסולה ועד סיום הבדיקה אסור להימצא סמוך למקורות של שדות אלקטרומגנטיים חזקים, כגון : מכשיר MRI מגלה מתכות. כמו כן כניסה למים אסורה.
3. משך הבדיקה הוא 9 שעות ובמהלכה מומלץ להימנע ממאמץ גופני, רכינה או התכופפות מוגזמת כדי למנוע תזוזת החגורה. אין להסיר את החגורה בזמן הבדיקה.
4. יש לנהוג במכשיר ההקלטה בזהירות, להימנע מחבטות למכשיר או מתנועות פתאומיות.
5. לאחר 9 שעות בסיום הבדיקה עליך להתנתק מהמכשיר ולהחזירו למכון.

שעה	הוראות
	תחילת הבדיקה
	שתיה
	אוכל (גבינה לבנה, פיתה עם חמוס)
	סיום
	טלפון לבירורים : 09-7472729