

הכנה לבדיקת לחץם של הרקטים (מנומטריה רקטלית)מטופל/ת יקר/ה,

הນך מזמין/ת לבדיקה שטורתה לבדוק את שרירי הסוגר של פי הטעעת. הבדיקה נעשית לבירור במצבים של קושי בחתוךנות או של חסור שליטה על מותן צואה. הפניה לבדיקה מתבצעת בהמלצתו של רופא גסטרואנטראולוג. יש להגיע למזכירות המכוון ביום ובשעה הרשומות בהזמנה לבדיקה. יש להציג בתעודה מזהה ובהתcheinויות כספית מתאימה (טיפות 17). אם אתה/ת סובל/ת ממחלה מדבקת, נא הודעה/י לרופאה/ה הבודק/ת. לידייתך, את משתודלים לקבל את המטופלים לפני השעה הרשומה בהזמנה, אך לעיתים סדר קבלת החולים משתנה בהתאם לשוקלים רפואיים.

אם אין לך יכולת הגיעו לבדיקה אנא הודעה/י על כך שבוע לפני הבדיקה למזכירות המכוון.

הכנות לבדיקה

יש צורך לבצע שני חוקני ניקוי "אייזי גו" (Easy Go) 180 מ"ל בבוקר הבדיקה, ושבתיים לפני מועד הבדיקה.

- חוקן זה יש לבצע בשכיבה על צד שמאל.

- יש להחדיר את פיתת תבוקבוק אל פי הטעעת ולתוחץ עד להתרוקנות מלאה של המיכל.
- לאחר פעולה זו יש להישאר לשכב 15 דקות על צד שמאל וرك לאחר מכן להתרוקן.

הכנה זו אינה מתאימה לחולים עם אי-ספיקת כליה. יש להתייחס עם רופא המשפחה או הרופא המפנה לבדיקה.

מהלך הבדיקה

- במהלך הבדיקה יוחדר לפי הטעעת קטטר שבקצחו האחד בלבד ובಕצחו החיצוני מחובר למכשיר למדידת לחץם.
- בזמן הבדיקה הרופא יבקש ממך להפעיל לחץם שונים כמו לחץ ליציאה או לחlopenיו לדמות פעולות התဏפות.
- משך הבדיקה כ-20 דקות.
- בתום הבדיקה מתקבל תרשיס לחץם העובר פגעה על-ידי רופא גסטרואנטראולוג.
- ממצאי הבדיקה וחמלצות להמשך טיפול יישלו לביקך.
- יש לקבוע תור לרופא גסטרואנטראולוג שאצלו אתה/ת נמצא/ת במעקב.

**ברכת רפואה שלמה
צוות המכון הגסטרואנטראולוגי**