

דף מידע לפני ביצוע תבחין סינקטן (Synacthen-Test)

מטופל יקר,

הינך מוזמן לביצוע תבחין סינקטן (Synacthen-Test)

סינקטן (Synacten) הינו חומר סינטטי, הדומה בהשפעתו להורמון ה- ACTH המופרש מבלוטת יותרת המוח. תפקיד הורמון ה- ACTH הוא לווסת את הפרשת ההורמונים מבלוטת יותרת הכליה (האדרנל). בתגובה לעליית רמתו בדם, מפרישה בלוטת יותרת הכליה הורמונים שונים שהעיקרי בהם הוא הקורטיזול (Cortisol). הקורטיזול משפיע על תהליכים שונים בגוף ומופרש כתגובה למצבים כמו: דחק, דלקת, שינויים ברמת הסוכר בדם ועוד.

מטרת התבחין

- לבחון את תפקוד בלוטת יותרת הכליה.
 - לבחון את תפקוד מנגנון הגומלין בין בלוטת יותרת המוח לבין בלוטת יותרת הכליה.
 - לבחון את תפקוד בלוטת יותרת הכליה, בעת גמילה מטיפול בסטרואידים.
- משך הבדיקה כ-שלוש שעות.

מהלך התבחין

לאחר נטילת דגימת דם ראשונה, יוזרק לך סינקטן דרך הוריד, במינון שיקבע על ידי הרופא. במסגרת התבחין, תלקחנה דגימות דם נוספות, דרך אותו וריד: 30 דקות ו- 60 דקות לאחר הזרקת הסינקטן. יתכנו מצבים בהם תידרשנה דגימות דם נוספות וזמני לקיחת דם נוספים, בהתאם לבקשת הרופא.

הנחיות כלליות לקראת הבדיקה

- יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של הקופה בה אתה מבוטח ובטופס התחייבות מתאים - טופס 17. קוד כללית - 72391.
- אין צורך בצום.
- בבקר הבדיקה יש להימנע משתייה ומאכילה של חומרים המכילים קפאין (קפה, תה, שוקו, שוקולד).
- אם הנך נוטל סטרואידים, או אלדקטון (spironolactone) - יש להפסיק את השימוש בהם, ערב לפני ביצוע התבחין ואין לקחתם בבוקר הבדיקה.
- ניתן ליטול את יתר הטיפול התרופתי הקבוע כרגיל.
- מומלץ להגיע לבדיקה עם מלווה.

תופעות לוואי

תתכנה תופעות לוואי מקומיות במקום ההזרקה, כמו אודם או נפיחות. כמו כן, בסמוך להזרקת הסינקטן, תתכנה התופעות הבאות: בחילה, הסמקה, השפעה על קצב הלב ופריחה. במקרה זה, תטופל על ידי צוות המכון בהתאם.

תשובות התבחין ישלחו לרופא המפנה

בברכת בריאות שלמה
צוות המכון לאנדוקרינולוגיה