

הנחיות לפני הסרת נגעים בלייזר

מה מכשיר הלייזר?

הלייזר הינו מכשיר בעל עוצמת אור מוגברת ובעלת אותו אורך גל, הדחוסה בתוך אלומה. הפעלת אלומת האור על הנגע יוצרת תגובת חום, הגורמת להרס תאי הנגע. בפעולה זו בדרך כלל לא נלקחת דגימה מהנגע.

הנחיות לפני הפעולה

- יש להמשיך ליטול תרופות כרגיל. בהגיעך- דווח לצוות על התרופות אותן נטלת.
- ניתן לאכול ולשתות כרגיל.
- אין למרוח על האזור חומרים כגון: מייק אפ, קרם לחות, קרם גוף וכדומה.

הנחיות ביום הפעולה

- יש להצטייד בטופס התחייבות מתאים (טופס 17) קוד כללית - 85550, קוד משרד הבריאות - 17000.
- בהגיע תורך תיקרא לחדר הלייזר להסבר על הפעולה מרופא ומאחות.
- לאחר ההסבר תתבקש לחתום על הסכמה לביצוע הפעולה.
- תקבל משקפיים מיוחדות להגן על עיניך (גם הרופא והאחות ירכיבו משקפיים).
- הפעולה נעשית בדרך כלל ללא אלחוש. אם תחוש כאב, דווח לרופא ולאחות.
- בעת הפעולה ישמע רעש ממכונה, שתפקידה לשאוב את העשן הנפלט מצריבת הנגע.
- לידיעתך! - כניסת מלווה בעת הפעולה אינה אפשרית, מסיבות בטיחותיות.
- הפעולה גורמת להיווצרות פצע קטן. האזור יחבש עם משחה אנטיביוטית.

הנחיות לאחר הפעולה

- בסיום הפעולה, תקבל הסבר ומכתב עם הנחיות להמשך טיפול בבית.
- על פי החלטת הרופא, תקבל מרשם למשחה אנטיביוטית והוראות לטיפול.
- אין להרטיב האזור בו בוצעה הפעולה במשך 24 שעות.
- אם תחוש כאב, ניתן ליטול משכך כאב, אותו הינך רגיל לקחת.
- אם יופיעו באזור בו בוצעה הפעולה: אודם, חום מקומי או הפרשה - עליך לפנות למרפאתך בקהילה.
- אין להוריד את הגלד הנוצר, יש להמתין שיפול מעצמו.
- לידיעתך - לעיתים נותרת צלקת באזור הפעולה.
- עליך להמשיך במעקב אצל רופא עור.
- יש להימנע מחשיפת האזור לשמש, לפחות למשך חצי שנה. רצוי להשתמש במסנן קרינה מעל SPE 30.

* יתכנו שינויים בהנחיות, בהתאמה לשונות האישיות.

בברכת בריאות שלמה
צוות המרפאה לכירורגיה פלסטית