

## הזרקת סטרואידים (DEPO-MEDROL) לצלקת

"מרפאת הזרקות" מתקיימת בימי א', במרפאה לכירורגיה פלסטית. ההזרקה מתבצעת על ידי אחות המרפאה, לאחר הפניה מרופא, ועל פי פרוטוקול רפואי. התור נקבע על ידי מזכירת המרפאה. יש להצטייד בהתחייבות מתאימה (טופס 17) - קוד פעולה 64608 או קוד משרד הבריאות 90072. בסיום ההזרקה, יש לקבוע תור (אצל מזכירת המרפאה) להזרקה נוספת, אם מתוכננת.

**סדרת הזרקות:** 6 הזרקות או פחות - לפי החלטת הרופא.

**תכיפות ההזרקה:** הזרקה לצלקת כל 3 - 5 שבועות.

**החומר המוזרק:** דפו מדרול (DEPO-MEDROL)

**מטרת הטיפול:** לשטח ו"לרכך" את הצלקת, להקל על תופעות כמו: גרד, כאב, תחושת עקצוץ ושריפה. לידיעתך הטיפול **אינו** מעלים צלקות.

**לאחר ההזרקה:** אין להרטיב את אזור ההזרקה במשך 24 שעות. אין לשים יריעות סיליקון במשך 24 שעות. עליך להימנע מחשיפת אזור הצלקת לשמש.

### תופעות הלוואי השכיחות ביותר:

תחושת כאב בעת ההזרקה.  
שינוי בצבע העור - באזור ההזרקה, צבע העור בהיר יותר.  
בדרך כלל, צבע העור חוזר לצבע העור הבריא, לאחר מספר חודשים מסיום ההזרקות.  
העור סביב הצלקת הופך דקיק יותר.  
העור נעשה מעט שקוע.  
התפתחות נימיי דם זעירים באזור.  
תופעות לוואי מערכתיות אינן שכיחות.  
במקרים נדירים נצפו תופעות לוואי מהחומר המוזרק (דפו מדרול). במקרה זה, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי במרפאתך או במיון.

### לידיעתך:

- ❖ הטיפול אינו מבטיח העלמות או שיפור הצלקת.
- ❖ יתכן ותזדקקי/ ליותר מאשר סדרת הזרקות אחת.
- ❖ במקרים מסוימים, תיתכן חזרה של התופעה, גם לאחר גמר הטיפול ואף חודשים אחריו.
- ❖ במידה ובעתיד תזדקקי/ לפעולה כירורגית, עליך ליידע את הרופא על נטייתך לפתח צלקות קלואידיות/היפרטרופיות.
- ❖ הימנע/י מביצוע פירסינג וקעקועים.
- ❖ יש להימנע מגרד פצע, משריטות ומחתיכים בגילוח.
- ❖ יש לשמור על הגיינת העור.

בסיום סידרת ההזרקות תופנה/י לבדיקה חוזרת של רופא.

בברכת בריאות שלמה  
צוות המרפאה לכירורגיה פלסטית