

המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד המרכז רפואי סורוקה

דף הסבר לבדיקת גסטרוסטומיה PEG / ג'וינוסקופיה PEJ

הכנסת צינור האכלה לקיבה דרך דופן הבטן

ההכנה לבדיקה בהתאם להנחיות הינה חיונית לביצוע הבדיקה

מטרת הבדיקה

גסטרוסטומיה PEG / ג'וינוסקופיה PEJ הינם בדיקות שמתבצעות באמצעות החדרת צינורית עשויה מסיליקון ישירות לקיבה או מעי דרך חתך בעור הבטן במטרה לספק מזון, נוזלים ותרופות למטופלים אשר אינם מסוגלים לאכול דרך הפה.

הכנות לקראת הבדיקה

- יש להגיע בצום החל מ- 12 שעות לפני הטיפול.
- יש להגיע למכון גסטרו בליווי בן משפחה או אפוטרופוס משפטי ולהצטייד בכתב מנוי משפטי תקף. אם האפוטרופוס הנה קרן חסויים – על המוסד לדאוג להחתמת המטופל.
- יש להגיע עם בדיקות דם עדכניות של כימיה מלאה, ספירת דם, טרומבוציטים ותפקודי קרישה INR, PTT, PT ובדיקת א.ק.ג עדכני.
- שבוע לפני הבדיקה, בתאום עם הרופא המטפל, יש להפסיק לקחת תרופות נוגדות קרישה כגון: אספירין, פלוויקס, קומדין, סינטרום. הפסקת פלוויקס באישור רופא קרדיולוג בלבד!!! אם המטופל מקבל קלקסן – אין לקחת אותו בבוקר הבדיקה.
- למטופלים סוכרתיים, אין לקבל אינסולין או תרופות אחרות לסוכרת ביום הבדיקה בתיאום עם הרופא המטפל.
- יש לוודא שהמטופל/ת לא סובל/ת ממחלת חום החל מ- 24 שעות לפני הבדיקה.

תהליך הבדיקה

הפעולה מתבצעת תחת חומרי טשטוש. בהתאם למצב המטופל ייתכן כי הפעולה תתבצע בהרדמה מלאה.

לצורך ביצוע הגסטרוסטומיה מיוחדת, דרך חתך קטן בדופן הבטן העליונה משמאל, חוט מוליך הנתפס על ידי האנדוסקופ ומוצא דרך הפה. דרך הפה מיוחדת צינור האכלה המועבר על ידי אותו חוט ומוצא מחוץ לדופן הבטן באזור החתך. בסוף הפעולה נמצא קצהו האחד של הצינור בתוך הקיבה וקצהו השני מחוץ לדופן הבטן. דרך פתח זה ייוחדר המזון.

- על מנת למנוע זיהום כתוצאה מהחדרת הגסטרוסטום דרך דופן הבטן מקבל החולה טיפול אנטיביוטי בסמוך לביצוע הפעולה.
- משך הפעולה כ- 30 דקות והיא כרוכה באי נוחות ובתחושה של נפיחות בבטן.

לאחר הפעולה

המטופל יועבר להשגחה בחדר ההתאוששות במכון ולאחר מכן יוחזר למחלקת האם או בית אבות, או לביתו. כמו כן יקבל חוברת הדרכה והסבר מפורט לגבי תזונה וטיפול בPEG/PEJ

אם אין ביכולתך להגיע לבדיקה אנא עדכן אותנו על מנת שנוכל לסייע ולתאם את התור למשהו שזקוק לו

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה