

הכנה לבדיקת קולונוסקופיה עם מוביפרפ (MOVIPREP)

מרכז טב الجهاز الهضمي وأمراض الكبد

تعليمات التحضير لفحص تنظير القولون (الأمعاء الغليظة) مع محلول موفبيريب (MOVIPREP)

التحضير للفحص وفقاً للتعليمات ضروري لإجراء الفحص

إرشادات ومعلومات هامة استعداداً للفحص:

- لا تستخدم/ي موفبيريب إذا كنت تعرف عن نقص في انزيم G6PD - (الجلوكوز 6 - فوسفات ديهيدروجينيز)
- يجب الحضور إلى الفحص مع مرافق بالغ.

تناول الأدوية:

- يسمح بتناول الأدوية التي تتناولها بشكل دائم كالمعتاد، لا حاجة للتوقف عن تناول الأسبرين.
- إذا كنت تتناول/ين دواء كوماتين أو بلافيكس أو أدوية أخرى لتمييع الدم، يجب استشارة طبيب العائلة أو أخصائي أمراض القلب.

التغذية السليمة استعداداً للفحص:

- تناول الوجبة الأخيرة قبل 24 ساعة من إجراء الفحص. خلال اليوم يُسمح بتناول السوائل الصافية مثل: الشوربة، الشاي مع إضافة السكر أو العسل، المياه بمذاقات الفواكه، نسكافيه/ أو الأسبريسو من دون الحليب.

التحضير بواسطة الأدوية:

- يجب التزود بوصفة من الطبيب لمحلول موفبيريب (MOVIPREP) + أربع حبات من دواء لكسادين LAXADIN .
- يجب تناولين حبتين من دواء لكسادين LAXADIN قبل ربع ساعة من كل وجبة موفبيريب - MOVIPREP.

طريقة التحضير للفحص:

- موفبيريب هو مستحضر بطعم الليمون يحتوي على أربعة أكياس من المسحوق من نوعين: كيسان كبيران رقمهما 1 وكيسان صغيران رقمهما 2. الأكياس الأربعة مطلوبة لاستكمال علاج واحد.
- يتم التحضير في وجبتين، بحيث تحتوي كل وجبة (رزمة) على كيسين (الكيس رقم 1 + الكيس رقم 2).

عند إجراء الفحص حتى الساعة 10:00 صباحاً	عندما يتم إجراء الفحص بعد الساعة 10:00 صباحاً
1. في الساعة 16:00 في المساء الذي يسبق الفحص - يجب تفريغ الكيسين - رقم 1 ورقم 2 (من الرزمة الأولى) في داخل لتر من الماء - (حوالي 4 أكواب)، وخلطها جيداً حتى الذوبان الكامل. ثم إدخالها في الثلاجة والبدء بشرب المحلول (يحبذ شرب كوب واحد كل 15 دقيقة). 2. في الساعة 20:00 في المساء الذي يسبق الفحص - يجب تفريغ الكيسين - رقم 1 ورقم 2 (من الرزمة الثانية) في داخل لتر من الماء - (حوالي 4 أكواب)، وخلطها جيداً حتى الذوبان الكامل. ثم إدخالها في الثلاجة والبدء بشرب المحلول (يحبذ شرب كوب واحد كل 15 دقيقة).	1. في الساعة 20:00 في المساء الذي يسبق الفحص - يجب تفريغ الكيسين - رقم 1 ورقم 2 (من الرزمة الأولى) في داخل لتر من الماء - (حوالي 4 أكواب)، وخلطها جيداً حتى الذوبان الكامل. ثم إدخالها في الثلاجة والبدء بشرب المحلول (يحبذ شرب كوب واحد كل 15 دقيقة). 2. خمس ساعات قبل الفحص - يجب تفريغ الكيسين - رقم 1 ورقم 2 (من الرزمة الثانية) في داخل لتر من الماء - (حوالي 4 أكواب)، وخلطها جيداً حتى الذوبان الكامل. ثم إدخالها في الثلاجة والبدء بشرب المحلول (يحبذ شرب كوب واحد كل 15 دقيقة).
3. بعد شرب محلول " موفبيريب " تشعر بالحاجة إلى الإسهال، ولذلك يفضل أن تكون قريباً من المراحيض. 4. من المفضل تخزين محلول " موفبيريب " في الثلاجة من أجل تحسين الطعم (يمكن تحلية المحلول الجاهز).	

من الهام جداً أن تعرف:

1. الاستمرار في شرب لتر آخر من السوائل (نصف لتر بعد الوجبة الأولى، ونصف لتر بعد الوجبة الثانية)، لأي سائل صاف في أي وقت يناسبك، لتجنب حالة العطش والجفاف. يمكن شرب هذه السوائل بشكل غير محدود وتحليتها حسب الحاجة.
2. 4 ساعات قبل إجراء الفحص يجب التوقف تماماً عن تناول أي مشروب وأن تبقى في حالة الصيام التام.
3. يجب الوصول إلى الفحص مع مرافق وهذا أمر إلزامي

إذا لن تتمكن من الحضور للفحص، يرجى إبلاغنا مسبقاً حتى نتمكن من المساعدة وتنسيق الموعد لشخص آخر