

המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד המרכז רפואי סורוקה

הוראות הכנה לבדיקת קולונוסקופיה עם מוביפרפ (MOVIPREP)

ההכנה לבדיקה בהתאם להנחיות הינה חיונית לביצוע הבדיקה

הנחיות ומידע חשוב לקראת הבדיקה:

- אל תשתמש י/ במוביפרפ אם ידוע לך על חוסר באנזים G6PD (גלוקוז 6- פוספאט דהידרוגנאז)
- חובה להגיע לבדיקה עם מלווה בוגר.

נטיילת תרופות:

- מותר לקחת תרופות קבועות כרגיל, אין צורך להפסיק אספירין.
- אם הנך נוטלת קומדין או פלביקס או תרופות אחרות לדילול הדם, יש להתייעץ עם רופא משפחה או קרדיולוג.

כלכלה נכונה לקראת הבדיקה:

- ארוחה אחרונה 24 שעות לפני הבדיקה. בהמשך היום מותרת שתיית נוזלים צלולים כגון: מרק צח, תה בתוספת סוכר או דבש, מים בטעמים, נס קפה / אספרסו ללא חלב.

הכנה באמצעות תרופות:

- יש להצטייד במרשם רופא ל- "מוביפרפ (MOVIPREP) + 4 טבליות LAXADIN.
- יש ליטול 2 כדורי LAXADIN, רבע שעה לפני כל מנת מוביפרפ.

אופן ההכנה לבדיקה:

- מוביפרפ** הינו תכשיר בטעם לימון המכיל 4 שקיות אבקה משני סוגים, שתי שקיות גדולות שמספרן 1 ושתי שקיות קטנות שמספרן 2. ארבעת השקיות נדרשות להשלמת טיפול אחד.
- ההכנה מתבצעת בשתי מנות כשכל מנה (חבילה) מכילה צמד שקיות (שקית מספר 1 + שקית מספר 2)

אם הבדיקה מתבצעת עד השעה 10:00 בבוקר	אם הבדיקה מתבצעת אחר השעה 10:00 בבוקר
1. בשעה 20:00 ערב לפני הבדיקה - לרוקן את שתי השקיות, מספר 1 ומספר 2 (מתוך החבילה הראשונה) ליטר מים (בערך 4 כוסות) ולערבב היטב עד המסה מלאה, להכניס למקרר ולהתחיל לשתות את התמיסה (מומלץ כוס כל 15 דקות). 2. 5 שעות לפני הבדיקה יש לרוקן את שתי השקיות, מספר 1 ומספר 2 (מתוך החבילה השנייה) לתוך ליטר מים (בערך 4 כוסות) ולערבב היטב עד המסה מלאה, להכניס למקרר. ולהתחיל לשתות את התמיסה (מומלץ כוס כל 15 דקות).	1. בשעה 16:00 ערב לפני הבדיקה - לרוקן את שתי השקיות, מספר 1 ומספר 2 (מתוך החבילה הראשונה) לתוך ליטר מים (בערך 4 כוסות) ולערבב היטב עד המסה מלאה, להכניס למקרר ולהתחיל לשתות את התמיסה (מומלץ כוס כל 15 דקות). 2. בשעה 20:00 ערב לפני הבדיקה יש לרוקן את שתי השקיות, מספר 1 ומספר 2 (מתוך החבילה השנייה) לתוך ליטר מים (בערך 4 כוסות) ולערבב היטב עד המסה מלאה, להכניס למקרר. ולהתחיל לשתות את התמיסה (מומלץ כוס כל 15 דקות).
3. לאחר שתיית "מוביפרפ" תרגיש צורך לשלשל, לכן רצוי להיות קרובים לשירותים 4. רצוי לאחסן את ה "מוביפרפ" במקרר לשיפור הטעם (ניתן להמתיק את התמיסה המוכנה).	

חשוב מאוד לדעת:

- להמשיך לשתות עוד ליטר נוזלים (חצי ליטר אחרי המנה הראשונה וחצי ליטר אחרי המנה השנייה) של נוזל צלול כלשהו בכל זמן אשר נוח לך, על מנת למנוע מצב של צמא והתייבשות. נוזלים אלו ניתן לשתות ללא הגבלה ולהמתיק לפי הצורך.
- ארבע שעות לפני הבדיקה יש להפסיק בכלל כל שתייה ולהישאר בצום מלא.
- חובה להגיע לבדיקה עם מלווה בוגר.

אם אין ביכולתך להגיע לבדיקה אנא עדכן אותנו על מנת שנוכל לסייע ולתאם את התור למשהו שזקוק לו

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה