

בדיקת LP (ניקור מותני) ו-IT (הזרקת תרופה לחלל השדרה) - מידע להורים

מטרת הבדיקה

- אבחון ומעקב של מעורבות מערכת עצבים מרכזית במחלה
- הזרקת תרופות לחלל בשדרה כדי למנוע חזרה של מחלה בנוזל השדרה (בלויקמיות)
- ניקור מותני נעשה לפעמים בחשד לזיהום חיידקי במערכת עצבים מרכזית או לצורך מדידת לחץ הנוזל במוח (בעיקר בגידולים של מערכת עצבים מרכזית).

הכנה לבדיקה

- בדיקה זו נעשית לילדים בהרדמה על מנת למנוע כאב ואי נוחות
- הילד צריך להיות בצום לפחות שמונה שעות לפני הבדיקה.

מהלך הבדיקה

- הבדיקה מבוצעת על ידי רופא ובנוכחות רופא מרדים בחדר הטיפולים של המחלקה או של אשפוז יום
- במהלך הבדיקה, הילד שוכב על הצד בתנוחה עוברית (ראש וברכיים מקופלות לבטן)
- המחט מוחדרת בין החוליות בחלק תחתון של עמוד השדרה, במקום שחוט השדרה נגמר
- הבדיקה נמשכת 15 – 20 דקות.

מעקב אחרי הבדיקה

- לאחר הבדיקה הילד נשאר בהשגחה עד שהוא מתעורר ומתחיל לשתות
- מומלץ לשכב על הגב כשעה לאחר הבדיקה על מנת למנוע תופעות כמו כאבי ראש וסחרחורות בהמשך
- לאחר הבדיקה, הילד עלול לחוש כאב במקום הדקירה
- אפשר לטפל בנוגדי כאבים לפי הצורך.

