

מרפאה אורולוגית
טלפון 08-6403184, פקס 08-6245929

טיפול כימותרפיה בכיס שלפוחית השתן - מידע והנחיות

רקע

- טיפול כימותרפי נועד להרסית התאים הסרטניים. כאשר הטיפול ניתן ישירות לשלפוחית השתן, התרופות יוצרות מגע עם התאים הסרטניים המצויים בדופן השלפוחית
- היות והתרופות ניתנות ישירות לשלפוחית ולא דרך צינורית המחוברת למחזור הדם, לא צפויות תופעות לוואי, כגון: נשירת שיער, בחילות והקאות
- רק לעיתים נדירות נספגות התרופות במחזור הדם ולכן לא קיימת סבירות שהטיפול ישפיע על שאר חלקי הגוף
- לרוב ניתן הטיפול פעם בשבוע במשך שישה שבועות
- התרופות הנפוצה לכימותרפיה לשלפוחית היא מיטומיצין-C
- הטיפול ניתן באמצעות צינורית גמישה (קטטר) המוחדרת לשלפוחית ודרכה עובר נוזל הכימותרפיה
- הטיפול בבית החולים במסגרת טיפול יום וניתן להשתחרר הביתה בסיומו
- מומלץ להגיע לטיפול עם מלווה.

לפני קבלת הטיפול

- יש להגביל את כמות הנוזלים ששותים ביום הטיפול:
 - למנוע תחושת אי נוחות בשלפוחית
 - שתייה מועטה מסייעת לריכוז גבוה של כימותרפיה בשלפוחית
- יש לדווח לרופא על כל התרופות שנוטלים
- אם נוטלים תרופות המשפיעות על השתן, כגון: משתנים ותרופות המגבירות הטלת שתן, יש ליטול מאוחר יותר ביום לאחר סיום הטיפול
- לא תינתן כימותרפיה כאשר המטופס אינו חש בטוב או חולה בדלקת בדרכי השתן.

המלצות לאחר הטיפול

- המטופל מתבקש להימנע ממתן שתן במשך כשעה עד שעה וחצי לאחר מתן הכימותרפיה, במטרה לאפשר לתרופות לפעול כנגד הגידול הסרטני בשלפוחית
- לאחר שעה וחצי ממתן הטיפול, להקפיד על שתייה מרובה אך לא מוגזמת
- אמצעי זהירות לאחר הטיפול בכדי להגן על המטופל ועל הסובבים אותו מפני מגע עם התרופות הכימיות:
 - מומלץ לתת שתן בישיבה כדי למנוע התזת שתן על האסלה
 - לשטוף את האזור בהירות עם סבון ומים לאחר הטלת השתן, כדי לוודא שלא נשארו שאריות תרופות כימיות על העור
 - לנקות את השירותים עם אקונומיקה, להשאיר במשך 15 דקות ולאחר מכן לשטוף את השירותים
 - אם יש שני חדרי שירותים בבית, עדיף שהמטופל בלבד ישתמש באחד מהם במשך 24 שעות
 - להקפיד שטיפת ידיים לאחר הביקור בשירותים
- על גברים להשתמש בקונדום בקיום יחסי מין במשך 48 השעות הראשונות לאחר הטיפול
- נשים העוברות טיפול:
 - מומלץ שלא להיכנס להריון בעת קבלת כימותרפיה
 - לבקש מבן הזוג להשתמש בקונדום בקיום יחסי מין.

תופעות לוואי אפשריות

- דלקת של דופן השלפוחית (ציסטיטיס)
 - כאבים
 - צריבה
 - חום
 - תכיפות במתן שתן
- תופעות אלו חולפות תוך ימים ספורים
- שתייה מרובה מקלה על תחושת הצריבה והגירוי.
- ניתן להיעזר בנטילת משככי כאבים לפי הצורך
- לעיתים, אצל חלק מהמטופלים מופיעה פריחה על הידיים או הרגליים
- אם חום הגוף גבוה מ-38.5 מעלות צלזיוס, יש להגיע למיון עם מכתב הפניה.

בברכת בריאות טובה, צוות מרפאה אורולוגית

עדכון אחרון: 21.3.19, ט"ב

