

מרפאה אורולוגית

טלפון 08-6403184, פקס 08-6245929

שטיפת שלפוחית השתן - BCG מידע והנחיות

רקע

- שטיפת שלפוחית השתן המבוצעת באמצעות תמיסה של חיידק שחפת מוחלש - BCG נמצאה יעיל ה לטיפול בסרטן שלפוחית השתן
- תוכן התמיסה יוצר דלקת בשכבה הפנימית של השלפוחית השתן ועל-ידי כך מפעיל את המערכת החיסון
- הטיפול ניתן אחת לשבוע במשך ששה שבועות
- בגמר ששת השבועות מופסק הטיפול לחודש שבתומו מוזמן המטופל לבדיקת ציסטוסקופיה
- המשך הטיפול נקבע בהתאם להחלטת הרופא .

ההסבר והנחיות לקראת הבדיקה

- אין צורך בצום
- רצוי לא להרבות בשתייה בפרט קופאין
- רצוי להתרחץ בבוקר הטיפול
- רצוי להגיע עם מלווה
- יש להביא טופס התחייבות מהקופה המבטחת
- אין ליטול תרופות משתנות בבוקר הטיפול, אלא רק שעתיים לאחר הטיפול לפני הטיפול:
- יש להגיע למזכירות המרפאה להנפקת מדבקות
- אחות במרפאה מדריכה את המטופל
- המטופל מתבקש לגשת לשירותים לרוקן את שלפוחית השתן (אם יש קטטר קבוע אין צורך)
- רופא מסביר ומחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת
- המטופל מתבקש להוריד את הבגדים התחתוניים (מכנסיים, תחתונים ונעליים) ולובש חלוק

אופן ביצוע הטיפול

- המטופל מתבקש לשכב על מיטה עם רגליים פשוקות
- הטיפול ניתן בצורה סטרילית
- הרופא מחטא את האזור שדרכו מוכנס צנתר לצורך הזלפת הטיפול
- בגמר הטיפול מוצא הצנתר
- אם יש צנתר קבוע, הוא נסגר באמצעות קונקטור, המטופל נשאר במרפאה במשך שבתומו הצוות מוריד את הקונקטור ומחבר לשקית שתן.

לאחר הטיפול

- על המטופל לנסות להימנע ממתן שתן משך שעה וחצי
- מומלץ להתרוקן בישיבה למניעה של התזת שתן
- מומלץ לשטוף את האזור במים וסבון
- יש להקפיד על שטיפת ידיים
- מומלץ לקיים יחסי אישות עם קונדום במשך שבעה ימים

תופעות לוואי אפשריות 24 – 48 שעות לאחר הטיפול

חשוב לידע את הצוות המטפל בתופעות לוואי שהיו

- צריבה, תכיפות ודחיפות במתן שתן
- דימום קל במתן שתן
- תסמיני שפעת, כמו: עייפות, חולשה, חום, אי-נוחות, כאבי פרקים, כאבי ראש וסחרחורת
- פריחה ושיעול

תופעות המחייבות הגעה למיון התייחסות רפואית מיידי

- חום גבוה מ-38.5 מעלות צלזיוס
- דימום משמעותי
- אצירת שתן.

בברכת בריאות טובה - צוות מרפאה אורולוגית

עדכון אחרון: 21.3.19, ט"כ