

מרפאה אורולוגית
טלפון 08-6403184, פקס 08-6245929

שטיפות שלפוחית שתן עם חומצה היאלורונית - CYSTISTAT מידע והנחיות

- רקע**
 - תסמונת שלפוחית שתן הכאובה (Painful Bladder Syndrome – PBS\Interstitial Cystitis - IC), מתבטאת בכאב באגן, בדחיפות ובתכיפות בהטלת שתן ופוגעת משמעותית באיכות חייהם של המטופלים. שכיחות התסמונת באוכלוסייה המערבית היא 0.5% ושכיחותה הגבוהה יותר בנשים (נשים 9 – 1 גברים)
 - אחת מדרכי הטיפול היא שטיפות שלפוחית שתן עם CYSTISTAT - תרופה שמוזלפת על-ידי רופא לשלפוחית השתן על ידי קטטר.
- לקראת הבדיקה**
 - ארבע שעות לפני השטיפה, יש להימנע מלשתות או לאכול דברים המכילים קפאין
 - בבוקר הטיפול אפשרי לאכול אך רצוי שלא לשתות או לשתות כמות קטנה
- אופן ביצוע הטיפול**
 - המטופל מתבקש לפשוט מכנסיים ותחתונים לשכב על מיטה
 - הרופא מחטא את האזור שדרכו מוכנס צנתר לצורך הזלפת הטיפול
 - הרופא מחדיר קטטר (צנטר) ומזליף תרופה לתוך השלפוחית
 - בגמר הטיפול מוצא הצנתר.
- לאחר הטיפול**
 - על המטופל לנסות להימנע ממתן שתן במשך 45 דקות
 - יש להגביר שתיה לאחר התרוקנות ראשונה בכדי לשטוף את השלפוחית.
- תופעות לוואי**
 - לאחר שטיפות ב-CYSTISTAT כמעט ואין תופעות לוואי, פרט לסימני דלקת כגון צריבה ודחיפות במתן שתן כמו לאחר הכנסת קטטר
- תופעות המחייבות התייחסות רפואית**
 - צריבה, דחיפות ותכיפות במתן שתן שלא חולפות כעבור כמה ימים
 - חום גבוה מ-38 מעלות צלזיוס
 - אצירת שתן.

בברכת בריאות טובה - צוות מרפאה אורולוגית

עדכון אחרון: 21.3.19, ט"כ