



## דף הסבר

## ביופסיה של הערמונית (TRUS BIOPSY)

### מרפאה אורולוגית


בניין מרפאות חוץ

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400463

פקס. 08-6400181



### מטרת הבדיקה

הבדיקה נעשית לצורך הדגמת המבנה של הערמונית (פרוסטטה) ושלפוחיות הזרע, ולקחת דגימות מהערמונית.

### הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- אין צורך להגיע בצום.
- 10 ימים לפני ביצוע הביופסיה, בתיאום עם רופא המשפחה, עליך להפסיק את השימוש בתרופות הגורמות להפרעה בקרישת הדם כגון: Warferin, Aspirin, Plavix או Sintrom. (הפסקת Plavix באישור קרדיולוג בלבד).
- יש לבצע בדיקת INR יום לפני ביצוע הביופסיה.
- יש להתחיל טיפול אנטיביוטי Ciproxin 500 מ"ג פעמיים ביום, או Tarivid 400 מ"ג פעמיים ביום, החל מיומיים לפני הבדיקה. יש להמשיך את הטיפול ביום הבדיקה ועוד יומיים לאחריה.
- חוקנים: עליך לבצע פעמיים חוקן לניקוי המעיין עם Fleet enema (ניתן לקבל מרשם מהרופא המטפל). את החוקנים יש לבצע בערב שלפני יום הבדיקה ובבוקר יום הבדיקה.

### תהליך הבדיקה

- בהרדמה מקומית מיוחדת אולטרה-סאונד (מכשיר בדיקה) דרך פי הטבעת. המכשיר מדגים את הערמונית ומאפשר ביצוע ביופסיה מדויקת.
- הבדיקה עלולה להיות מלווה באי נוחות ובכאב קל. לעיתים, לאחר לקיחת ביופסיה תיתכן הרגשת חולשה, בחילה וסחרחורת לפרק זמן קצר.
- מספר הדגימות הנלקחות (8-12) נקבע לפי גודל הערמונית, גילו ומצבו של המטופל.
- תהליך ביצוע הביופסיה נמשך בין 5-10 דקות. משך זמן הבדיקה כ- 25 דקות.

### לאחר הבדיקה

- יש לחדש את השימוש בתרופות הגורמות להפרעה בקרישת הדם - שלושה ימים לאחר הבדיקה.
- עקב הדיקורים, ייתכן דימום קל מפי הטבעת או מדרכי השתן שחולף תוך פרק זמן קצר.
- במקרים בהם מופיע דימום עם קרישים מספר ימים לאחר הביופסיה - יש לפנות אל הרופא המטפל.
- במקרה של עליית חום מלווה בצמרמורת - יש לפנות לחדר מיון עם המכתב אותו קיבלת לאחר סיום הפעולה.
- ייתכן ויופיע דימום בצבע חלודה בנוזל הזרע במשך 3-4 שבועות לאחר ביצוע הביופסיה שחולף.

**בברכת בריאות שלמה**  
צוות המרפאה האורולוגית