

צנתר מרכזי מסוג פיק ליין (PICC LINE) - מידע והנחיות

הפניה בלשון זכר אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

לפניך מידע שיעזור לך להבין את התהליך ואת אופן ההחדרה של צנתר מסוג פיק ליין, ולהפחית את חששותיך. בכל שאלה אנא פנה אל הצוות המטפל!

מהו צנתר מסוג פיק ליין?

- פיק ליין הוא צנתר מרכזי המורכב מצינורית ארוכה, דקה וגמישה, המוחדרת לתוך אחד הוורידים הגדולים של הזרוע, בקרבת המרפק, וחלקו המרוחק מגיע לווריד מרכזי גדול לפני הכניסה לעלייה הימנית של הלב
- ניתן להבחין בחלקו הגלוי של הצנתר שבסיומו מצוי פקק.

למה משמש הצנתר?

- הצנתר מספק גישה קלה ונוחה אל הווריד, ומסייע לקבל טיפולים לאורך זמן
- דרך בצנתר ניתן להחדיר נוזלים, תרופות, דם ומרכיביו, וכן לקחת דגימות דם לצורך בדיקות מעבדה
- הצנתר חוסך את אי הנעימות הכרוכה בדקירות מחט חוזרות ונשנות בווריד הידיים
- הצנתר מאפשר לקבל טיפול ביתי.

לקראת החדרת הצנתר

- יש להיות בצום שעתיים לפני ביצוע פעולת ההחדרה של הצנתר
- יש להתקלח ולהקפיד על ניקיון הזרועות
- צוות המחלקה מוודא שנלקחו בדיקות דם בהתאם להוראות הרופא ומצייד את המטופל בחלוק
- המטופל נשלח אל היחידה לרדיולוגיה פולשנית (אנגיוגרפיה) במכון הרנטגן בליווי משנע ממכון הרנטגן לביצוע פעולת ההחדרה.

החדרת הצנתר

- את הצנתר מחדיר רופא רדיולוג במכון הרנטגן בהרדמה מקומית
- הפעולה מבוצעת רק לאחר שהמטופל מקבל הסבר וחותרם על הסכמה לביצוע הפעולה
- הרופא מחטא את הזרוע, מניח חוסם עורקים, מבצע הרדמה מקומית ומחדיר את המחט שאליה מחוברת הצינורית (הצנתר)
- לאחר הפעולה, הרופא מבצע שיקוף חזה כדי לבדוק שהצנתר במקום, מסיר את המחט ותופר את חלקו החיצוני של הצנתר
- אחות מצמידה את הצנתר לגוף בחבישה סטרילית
- בדרך כלל, התהליך אינו נמשך זמן רב
- בהמשך יתכנו כאב קל ולחץ בזרוע
- לאחר הפעולה אפשר לשתות ולאכול
- בתום הפעולה, משנה משיב את המטופל למחלקה.

לאחר החדרת הצנתר

- במשך יום או יומיים, יתכנו רגישות וחוסר נוחות בזרוע, כאב קל בזרוע ואף דימום קל ושטף דם תת עורי
- **חשוב** לדווח לצוות הסיעוד במחלקה על כל שינוי בהרגשה
- לפני השחרור מהמחלקה ניתן הסבר מפורט על: אופן הטיפול בצנתר, טכניקת החיבור של תמיסת האנטיביוטיקה ואחסונה ואופן האספקה של התמיסה מחברות **טבע ביתי** או **HOME CURE**.

כיצד לנהוג בבית?

- לתת מנוחה לזרוע במשך יום לאחר החדרת הצנתר
- אין לרחוץ באמבט, לשחות בבריכה או לשהות בגיקוזי
- יש להתקלח במקלחת בלבד ולכסות את אזור הצנתר בניילון נצמד ובפלסטר
- יש להימנע מתנועות נמרצות בזרוע
- אין לשאת משאות כבדים ביד שבה הוכנס הצנתר
- יש להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי פעילויות מותרות.

מצבים חריגים המחייבים פנייה לגורם רפואי

יש לפנות לרופא מטפל בקופת החולים או לחדר מיון במקרה של אחת מהתופעות הבאות:

- חום גוף גבוה מ-38 מעלות צלסיוס
- קושי או קוצר בנשימה
- תחושת כאב מקומי
- תחושת חום, אודם או נפיחות באזור של החדרת הצנתר או לאורך הזרוע
- חשד לסתימה של הצנתר
- חשד או יציאת הצנתר ממקומו באופן חלקי או מלא
- קרע בצנתר
- כמות גדולה של דמם ממקום ההחדרה הנספג בחבישה
- נזילה מסביב לצנתר בזמן מתן עירוי.

מספרי טלפון חיוניים

- **טבע ביתי**: 08-8510251
- **HOME CURE**: 1-800-30-68-68 (יעוץ שירות והדרכה 24 שעות ביממה)

בברכת בריאות טובה - צוות המחלקה