

טיפול בסינרגו - מידע והדרכה למטופל

רקע

סינרגו היא טכנולוגיה המשלבת חימום מקומי של הדופן של שלפוחית השתן ושטיפה בתרופה כימותרפית (MITOMYCIN), דרך קטטר הסינרגו המיוחד לשלפוחית השתן. הטיפול מיועד למנוע חזרה של גידול או לגרום לנסיגה בגידול קיים.

אפשרויות הטיפול בסינרגו

• טיפול פרופילקטי – מניעתי

מיועד לחולים לאחר כריתה או צריבה של גידול שטחי במטרה למנוע את חזרת הגידול.

שלבי הטיפול:

- מחזור של שישה טיפולים המבוצעים אחת לשבוע
- ביצוע בדיקת צסטוסקופיה לאחר מחזור טיפולים זה
- מחזור נוסף של שישה טיפולים אחת לחודש וחצי
- הפניה לביצוע בדיקת צסטוסקופיה על פי שיקול דעת של רופא אורולוג

• טיפול אבלאטיבי – להרס גידול קיים

מיועד לחולים עם גידול נרחב או עם גידולים מרובים בשלפוחית השתן שאינם ניתנים לכריתה בנייתוח בהרדמה וכאשר יש כשל או לסירוגין התווית נגד לטיפול BCG.

שלבי הטיפול:

- מחזור של שמונה טיפולים המבוצעים אחת לשבוע במינון כפול
- ביצוע בדיקות צסטוסקופיה לאחר ארבעה ולאחר שמונה טיפולים.

אפשרויות הטיפול ניתנות לשינוי בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל.

לקראת הטיפול

- אחות במרפאה אורולוגית מדריכה את המטופל לפני תחילת הטיפול כחלק חשוב בהכנה לטיפול
- לפני הטיפול הראשון, המטופל חותם על טופס הסכמה לטיפול
- משככי כאבים ניתנים בהתאם להנחיות

• לפני כל טיפול

○ יש לבצע:

- בדיקת שתן לתרבית ולכללית
- ספירת דם
- מדידת חום

○ אין ליטול תרופות משתנות (FUSID, DIZOTHIAZIDE) לפני הטיפול אלא רק שעתיים אחריו

○ מלאות של שלפוחית השתן מאפשרת הכנסה קלה יותר של הקטטר, ולכן מומלץ שלא לתת שתן בסמוך לתחילת הטיפול

בבוקר הטיפול בסינרגו

- אין צורך בצום – ניתן לאכול ארוחת בוקר לפני הטיפול
- יש להימנע משתייה, אלא לצורך נטילת תרופות בלבד
- רצוי להגיע עם מלווה
- יש להירשם במזכירות המרפאה ולמסור טופס התחייבות מתאים.

מהלך הטיפול

- המטופל שוכב על מיטת הטיפולים
- הטיפול מבוצע ללא הרדמה ועם אלחוש מקומי בלבד
- משככי כאבים ניתנים בהתאם להנחיות
- קטטר סינרגו מוחדר לכיס השתן לפני תחילת הטיפול ונשאר לאורך כל הטיפול - במשך כשעה עד שעה וחצי.

לקטטר סינרגו שלושה תפקידים:

- הזרמה מחזורית של תרופה כימותרפית
- חימום אחיד של דופן שלפוחית השתן
- ניטור טמפרטורה באמצעות מד חום.

לאחר הטיפול

- מומלץ להרבות בשתייה בימים הראשונים שלאחר הטיפול
- להתרוקן בשיבה ולהורי אצת מי האסלה פעמיים במשך 72 שעות לאחר הטיפול
- לכבס את בגדי המטופל בנפרד במשך 72 שעות לאחר הטיפול
- תופעות לוואי אפשריות (חולפות בדרך כלל בתוך 48 - 72 שעות מהטיפול):
 - חולשה והרגשה כללית רעה
 - צריבה או כאב במתן שתן – במידה והצריבה נמשכת יותר מ-72 שעות לאחר הטיפול, יש לדווח למרפאה ולבצע בדיקת שתן לתרבית במרפאת הקהילה
 - דימום קל בשתן. במקרה של דימום חזק יש לפנות לחדר מיון.
 - דחיפות ותכיפות במתן שתן
 - השתנה לילית מוגברת
 - יש לפנות אל חדר המיון במקרים אלה: חום גבוה מ-38.5 המלווה בצמרמורת, דימום מוגבר ואצירת שתן במשך יותר מחמש שעות
 - בהופעת גרד או פריחה בעור - יש ליידע את הצוות המטפל.

אם מתעוררות שאלות או בעיות בקשר לטיפול, ניתן לפנות אל צוות המרפאה בטלפון 08-6403184 (מזכירות)

בברכת בריאות טובה - צוות מרפאה אורולוגית