



דף הסבר

קליטת יוד רדיואקטיבי (UPTAKE)

המכון לרפואה גרעינית

ליד בניין ההנהלה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403936

פקס. 08-6383695

מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד בלוטת התריס.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש להגיע בצום החל מ-4 שעות לפני הבדיקה.
- אם הנך נוטל/ת אחת מהתרופות: Mercaptizol, (Propylthiouracil) -PTU יש להפסיק לקחת שבוע לפני הבדיקה בתאום עם רופא המשפחה.
- יש להפסיק לקחת Eltroxin 3-4 שבועות לפני הבדיקה בתאום עם רופא מהמכון לרפואה גרעינית.
- אם בוצעה בדיקת CT, צנתור, אנגיוגרפיה, IVP עם הזרקת חומר ניגודי - יש להמתין חודשיים מביצוע הבדיקה ועד לביצוע בדיקת קליטת יוד רדיואקטיבי, מכיוון שהחומר הניגודי המוזרק יכול לשבש את תוצאות הבדיקה.

תהליך הבדיקה

- תתבקש/י לבלוע קפסולה של יוד רדיואקטיבי במינון קטן.
- הבדיקה מתבצעת בשכיבה וכוללת שתי מדידות על ידי מכשיר הנצמד לצוואר.
- מדידה ראשונה מתבצעת שעתיים לאחר בליעת הקפסולה, ומדידה שנייה – 24 שעות לאחר בליעת הקפסולה.
- משך כל מדידה כ-2 דקות.
- משך זמן הבדיקה כשעתיים וחצי ביום הראשון ושעה עד שעה וחצי ביום השני.

לאחר הבדיקה

- עליך להישאר בצום במשך שעה נוספת לאחר בליעת הקפסולה.
- תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 10 ימים.

הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך – אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני מועד הבדיקה.

בברכת בריאות

שלמה

צוות המכון לרפואה גרעינית