



דף הסבר

טיפול בזבליו

המכון לרפואה גרעינית

ליד בניין ההנהלה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403936

פקס. 08-6383695

מטרת הטיפול

הטיפול ניתן למטופלים עם לימפומה פוליקולרית. החומר הרדיואקטיבי המוזרק קשור לנוגדן הפוגע בתאי המחלה.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- שבוע לפני הטיפול וביום הטיפול – יש לקבל עירוי של מבטרה בתאום עם הרופא ההמטולוג.
- יש להצטייד בסטרואידים ואנטיהיסטמינים למקרה של תגובת רגישות.

תהליך הבדיקה

- מזריקים חומר רדיואקטיבי דרך פילטר לתוך הוריד עד 8 שעות מהכנת התכשיר.
- משך זמן הטיפול כ-10 דקות.

לאחר הטיפול

- במשך שבוע לאחר הטיפול יש להטיל שתן בישיבה ולאחר מכן לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון.
- יש לשטוף היטב ידיים עם מים וסבון לאחר מגע עם דם או הפרשות.
- יש להשתמש בקונדום בעת קיום יחסי מין עד שבוע לאחר הטיפול.
- מומלץ להשתמש באמצעי מניעה לפחות שנה מתחילת הטיפול (גברים ונשים).
- אצל נשים תיתכן סבירות נמוכה לפגיעה בפוריות. אצל גברים, תיתכן פגיעה זמנית בפוריות, ובמקרים נדירים קיימת אפשרות לפגיעה קבועה.
- ייתכן ויופיע דיכוי מח עצם הפיך המתפתח בין 4-6 שבועות ממתן הטיפול ומגיע לשיא בין השבועות 7-9.
- רוב החולים שמפתחים טרומבופניה ונויטרופניה דרגה 3-4 מתאוששים לאחר 12 שבועות.
- לא צפויות תופעות לוואי חריפות.

הערות

- נשים בהריון או אם קיים ספק לכך – אסור להן לקבל את הטיפול.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כך לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני קבלת הטיפול.

ברכת בריאות

שלמה

צוות המכון לרפואה גרעינית