



דף הסבר

מיפוי יוד כל גופי

המכון לרפואה גרעינית

ליד בניין ההנהלה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6403936

פקס. 08-6383695

מטרת הבדיקה

איתור מוקדים הקולטים יוד בגוף

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- אם בוצעה בדיקת CT עם הזרקת חומר ניגודי – יש להמתין 3 חודשים מביצוע ה-CT ועד לביצוע הבדיקה עם חומר רדיואקטיבי. מכיון שחומר הניגודי של ה-CT עלול לשבש את תוצאות הבדיקה.
- הכנה באמצעות תרופות או הפסקת Eltroxin, תיעשה לפי שיקול דעתם של הרופא/ה במכון לרפואה גרעינית והרופא המטפל ולפי הנחייה שלהם.

תהליך הבדיקה

- תתבקש/י לבלוע קפסולה של יוד רדיואקטיבי.
- כ-48-72 שעות לאחר נטילת הקפסולה מבצעים מיפוי.
- אם המטופל/ת קיבל/ה מנת טיפול של יוד רדיואקטיבי, המיפוי יתבצע כשבוע לאחר מתן הקפסולה.
- משך זמן המיפוי כ-40 דקות בשכיבה.

לאחר הבדיקה

תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל תוך 7-10 ימים.

הערות

- נשים בהריון, או אם קיים ספק לכך, או בתקופת הנקה – אסור להן לבצע את הבדיקה.
- נשים בתקופת הנקה, עליהן לדווח על כן לרופא מהמכון לרפואה גרעינית לפני ביצוע הבדיקה.

בברכת בריאות

צוות המכון לרפואה גרעינית

שלמה