



דף הסבר

בדיקת גסטרוסטומיה (PEG)

המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

בניין אשפוז מחלקות פנימיות,

קומה ראשונה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400739

פקס. 08-6383716

מטרת הבדיקה

גסטרוסטומיה (PEG) - בדיקה שמתבצעת באמצעות צינורית עשויה מסיליקון המוכנסת ישירות לקיבה דרך חתך בעור הבטן במטרה לספק מזון, נוזלים ותרופות למטופלים אשר אינם מסוגלים לאכול דרך הפה.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- יש להגיע בצום החל מ- 12 שעות לפני הטיפול.
- יש להגיע למכון הגסטרואנטרולוגי בליווי בן משפחה/אפוטרופוס משפטי ולהצטייד בכתב מנוי משפטי תקף. אם האפוטרופוס הנה קרן חסויים, על המוסד לדאוג להחתמתה.
- יש להגיע עם בדיקות דם עדכניות של: כימיה מלאה, ספירת דם, טרומבוציטים, תפקודי קרישה PT, PTT.
- שבוע לפני הבדיקה, בתאום עם הרופא המטפל, יש להפסיק לקחת תרופות נוגדות קרישה כגון: אספירין, פלוויקס, קומדין, סינטרום. הפסקת פלוויקס באישור קרדיולוג בלבד. אם המטופל מקבל קלקסן אין לקחת בבוקר הבדיקה.
- למטופלים סכרתיים, אין לקבל אינסולין או תרופות אחרות לסכרת ביום הבדיקה - בתאום עם הרופא המטפל.
- יש לוודא שהמטופל/ת לא סובלת ממחלת חום החל מ- 2 שעות לפני הפעולה.

תהליך הבדיקה

- הפעולה מתבצעת בעזרת אלחוש או הרדמה מקומית.
- ביצוע חתך קטן בדופן הבטן, דרכו מוכנסת צינורית האכלה ישירות לקיבה דרך הוושט, הקיבה והתריריון באמצעות אנדוסקופ.
- משך הפעולה כ- 30 דקות.

לאחר הפעולה

לאחר הפעולה המטופל יועבר להשגחה בחדר התאוששות במכון, ולאחר מכן יוחזר למחלקת האם (בית אבות/מחלקה/בית), כמו כן יקבל הדרכה בכתב לגבי תזונה וטיפול ב-PEG.

בברכת בריאות שלמה
צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה
ומחלות כבד