



דף הסבר

בדיקת סיגמואידוסקופיה

המכון

לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

בניין אשפוז מחלקות פנימיות,

קומה ראשונה

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400739

פקס. 08-6383716

מטרת הבדיקה

הסתכלות לתוך חלל המעי הגס התחתון לצורך אבחנה וטיפול בבעיות הקשורות למערכת העיכול התחתונה. הבדיקה מתבצעת באמצעות אנדוסקופ - צינור דק וגמיש הבנוי מסיבים אופטיים, מסביבו מעטה פלסטי ועוביו כאצבע. לעיתים מתבצעות במהלך הבדיקה פעולות כמו ביופסיה או כריתת פוליפ.

הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה

- אין צורך להגיע בצום.
- אם הנך נוטל/ת תרופות כגון: אספירין, קומדין, סינטרום - יש להפסיקן 7 ימים לפני הבדיקה בתאום עם הרופא המטפל.
- 3 שעות לפני מועד הבדיקה יש לנקות את המעי על ידי 2 חוקנים של Fleet Enema. החוקן מבוצע בשכיבה על צד שמאל, החדרת הפיה לפי הטבעת ולחיצת הבקבוק. יש להמתין 5 דקות לפני ההתרוקנות בשירותים. לאחר חצי שעה מביצוע החוקן הראשון יש לבצע את החוקן השני.
- אם הנך סובל/ת מלחץ דם גבוה או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך עד 3 שעות לפני הבדיקה.
- אנא לבש/י בגד נוח והשתדלי להגיע ללא תכשיטים, בית החולים אינו אחראי לאובדנם.

תהליך הבדיקה

- תתבקש/י לשכב על צד שמאל בברכיים מכופפות. האנדוסקופ מוחדר דרך פי הטבעת ודרכו מסתכל הרופא ובודק את המעי.
- תיתכן תחושת לחץ כמו לפני פעולת מעיים. תחושה זו נובעת מאוויר המוחדר למעי בעת הבדיקה וחולפת בתום הבדיקה.
- היות והבדיקה מתבצעת ללא צורך בזריקת הרדמה, אין כל הגבלה וניתן לשוב לפעילות הרגילה.
- משך הבדיקה כ-15 דקות.

לאחר הבדיקה

- לאחר סיום הבדיקה יימסרו לך תוצאותיה ותקבלי/י מכתב לרופא המטפל.
- הסיכונים והסיבוכים האפשריים מפורטים בטופס ההסכמה לבדיקה. על-פי החוק, חתימה על הסכמה לפצוע הפעולה היא תנאי הכרחי לביצועה.

בברכת בריאות שלמה

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה
ומחלות כבד