



דף הסבר

ניתוח הסרת פטריגיום

מראת עיניים

בניין מרפאות חוץ

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400556

פקס. 08-6400638

מהו פטריגיום?

פטריגיום הוא מצב בו רקמה מלחמית העין צומחת על פני בקרנית ומתחילה לכסות חלקים ממנה.

מהם הגורמים לפטריגיום?

ברוב המקרים של הפטריגיום נגרם על ידי חשיפה ממושכת לקרינת שמש או קרינת אולטרא-סגול. גם גירוי כרוני בשל עין יבשה עלול לתרום להתקדמות המחלה.

מהו מהלך המחלה?

הפטריגיום יכול להישאר קטן ולא משמעותי במשך שנים, אולם עלול גם להתקדם ולכסות חלקים גדולים מקרנית העין. במקרים קיצוניים עלול הפטריגיום לכסות את ציר הראיה או לעוות את הקרנית ולפגוע בחדות הראיה.

מהו הטיפול?

הטיפול היחיד המקובל כיום בפטריגיום הוא ניתוח.

מתי לנתח?


החלטת החולה: ברוב המקרים של החולה מחליט אם ומתי לעבור את הניתוח. לרוב, הסיבה הינה פגיעה אסתטית אשר אותה המטופל רוצה למנוע.
שיקולי הרופא: במקרים של פטריגיום משמעותי, עשוי הרופא להמליץ על הניתוח.
מקרים אלו כוללים: פגיעה בציר הראיה, עיוות הקרנית, או לפני ניתוח קטרקט באותה העין.

ההכנות לניתוח

לפני הניתוח יש להביא מכתב מהרופא המטפל המפרט את מצבך הגופני, תרופות אשר אתה נוטל ורגישויות אם ישנן. לעיתים תתבקש להביא בדיקות דם, אק"ג וצילום חזה. יש להמשיך את נטילת התרופות גם ביום הניתוח אלא אם ימסרו הוראות אחרות על ידי הרופא. אין לאפר את העיניים ביום הניתוח. יש לבוא לניתוח עם מלווה.

מהלך הניתוח

ברוב המקרים של הפטריגיום הניתוח מתבצע בהרדמה מקומית, ולעיתים נדירות מאד בהרדמה כללית. במהלך הניתוח משתמש המנתח במכשור עדין במיוחד והוא נעשה תחת תאורת מיקרוסקופ. במהלך הניתוח מוסר הפטריגיום מעל פני הקרנית. לעיתים מבוצעים תפרים בלחמית. בתום הניתוח העין נחבשת בתחבושת עד ליום המחרת.





דף הסבר

ניתוח הסרת פטריגיום

מרכאת עיניים

בניין מרפאות חוץ

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400556

פקס. 08-6400638

לאחר הניתוח


בשעות ובימים הראשונים שלאחר הניתוח צפויים כאבים בעין. את התחבושות יש להסיר מהעין רק ביום המחרת. לאחר הסרת התחבושות יש להתחיל בטיפול התרופתי (טיפות עיניים ו/או משחה) שאותן יש לקחת לפי הנחיות הרופא. לאחר הניתוח תתבקש/י להגיע לביקורת לפי הנחיות הרופא.

סיכוני הניתוח

בימים הראשונים לאחר הניתוח יתכנו כאבים, אודם בעין, סנוורים וטשטוש ראייה קל. תופעות אלו חולפות לרוב תוך מספר ימים עד מספר שבועות. במקרים **נדירים ביותר** עלולים להתרחש דימום, זיהום או סיבוכים אחרים העלולים לפגוע בראייה ובשלמות העין. צמיחה מחודשת של הפטריגיום תיתכן, אולם בשיטות הניתוח הקיימות היום, שיעור הפטריגיום החוזר הוא 5-10% בלבד.

בברכת בריאות שלמה

צוות מרפאת עיניים



פטריגיום