



דף הסבר

מרפאת לייזר

מרפאת עיניים

בניין מרפאות חוץ

ימים א'-ה'

משעה 08:00

טל. 08-6400556

פקס. 08-6400638

מטרת הבדיקה

ביצוע טיפול לייזר עבור מגוון מחלות. במרפאת הלייזר מבוצעים בעיקר שלושה סוגי טיפולים: לייזר לרשתית העין, לייזר לקשתית העין ולייזר לקופסית האחורית של העדשה בעין. שלושת טיפולים אלו שונים זה מזה בתכלית, וכל טיפול מותאם לבעיה אחרת בעיניים. לא בכל המקרים מבוצע טיפול - הדבר תלוי בהחלטת הרופא הבודק במרפאת הלייזר.

הכנות מיוחדות לבדיקה

- יש להביא סיכומים רפואיים קודמים של בדיקות עיניים.
 - יש להביא את רשימת טיפות העיניים אשר ניטלות על ידך, ועדיף אף להביא את בקבוקוני הטיפות עצמם.
 - אם ישנם ברשותך משקפיים - יש להביאם.
 - יש לציין כל רגישות לתרופות הידועה לך.
 - יש להביא צילומי עיניים ובדיקות אחרות אם ישנם ברשותך.
- טיפול לייזר דורשים לעיתים ביצוע של הרחבת אישונים. עליך לדעת כי אסור לנהוג במשך 3-4 שעות לאחר הרחבת האישונים, ולכן יש להיערך בהתאם. מומלץ במקרה זה להצטייד גם במשקפי שמש ומומלץ להגיע עם מלווה.

תהליך הבדיקה

לאחר תהליך הקבלה במשרד, מבוצעת בדיקת חדות ראייה על-ידי אחות. לאחריה תתבקש/י להמתין לבדיקת הרופא שיקרא לך בכריזה בהגיע תורך. ברוב המקרים, לפני בדיקת הרופא, יוזלפו טיפות להרחבת אישונים, ולאחר המתנה נוספת תבוצע בדיקת העיניים על ידי הרופא. לאחר הסבר על הפעולה המתוכננת, תידרש הסכמה בחתימתך לביצוע הפעולה. לאחר מכן יבוצע טיפול הלייזר על ידי הרופא. טיפולי הלייזר עלולים לגרום לכאב קל בזמן הפעולה, אולם הכאב הוא זמני וחולף.

לאחר הבדיקה

- לאחר בדיקת עיניים רגילה אין כל הגבלה. כאמור לעיל, אם בוצעה בדיקה בהרחבת אישונים הנהיגה אסורה במשך 3-4 שעות, ועל כן יש לדאוג למלווה/נהג.
- לאחר הרחבת אישונים עלול להופיע קושי בקריאה ועלולה להופיע תחושת סנוור ורגישות לאור. תופעות אלו הן רגילות וחולפות לאחר 3-4 שעות. מומלץ להשתמש במשקפי שמש.
- לאחר טיפולי לייזר עלולה להתעורר תגובת דלקת בעין וכן עליית לחץ תוך-עיני, ולכן, לעיתים, תתבקש/י להזליף טיפות למניעת דלקת ולהפחתת הלחץ התוך-עיני במשך מספר ימים.

בברכת בריאות שלמה

 צוות מרפאת עיניים

